Инструкция по применению
Гексавит Фармстандарт Драже 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Драже
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины
Количество в упаковке: 50



Описание

Гексавит – поливитаминное средство, используется в целях профилактики гиповитаминоза, содержит комплекс витаминов, которые являются важными факторами метаболических процессов. Препарат выпускается в форме драже со слабым характерным запахом (по 50 драже в банках полимерных). Фармакологическое действие обусловлено составом входящих в него компонентов. Аскорбиновая кислота - оказывает метаболическое действие, участвует в регулировании окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена. Никотинамид - стабилизирует процессы тканевого дыхания, жирового и углеводного обмена, систему метаболизма ксенобиотиков. Пиридоксина гидрохлорид (витамин B6) - способствует поддержанию структуры и функции костей, зубов, десен, оказывает влияние на эритропоэз, способствует нормальному функционированию нервной системы. Ретинол (витамин A) - жирорастворимый витамин, играет важную роль в окислительно-восстановительных процессах. Рибофлавин (витамин B2) - улучшает репаративные процессы в тканях, участвует в энергетическом обмене. Тиамин (витамин B1) - в качестве коэнзима играет важную роль в обмене углеводов, белков и липидов, в нормальном функционировании нервной системы. Отпускается без рецепта.

Действующее вещество

Поливитамины

Состав

Действующие вещества: Ретинола пальмитат (витамин А), Тиамина гидрохлорид (витамин В1), Рибофлавин (витамин В2), Никотинамид, Пиридоксина гидрохлорид, Аскорбиновая кислота. Вспомогательные вещества: воск пчелиный - 0,150 мг, подсолнечное масло - 0,206 мг, ароматизатор апельсиновый - 0,099 мг, мука пшеничная - 49,834 мг, патока крахмальная - 68,969 мг, сахароза - 786,308 мг, тальк - 0,575 мг, краситель хинолиновый желтый - 0,079 мг, краситель тропеолин О - 0,030 мг.

Форма выпуска

Драже

Показания

Профилактика гиповитаминоза.

Способ применения и дозы

Препарат принимают по 1 драже в день , внутрь, после еды. Курс лечения 30 дней. Через 2-3 месяца курс лечения может быть повторен по рекомендации врача. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. При-меняйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гипервитаминоз, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет, желчно-каменная болезнь, хронический панкреатит. Врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, сахарозоизомальтозная недостаточность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Не превышайте рекомендованной суточной дозы, при случайном приеме высоких доз немедленно обратитесь к врачу. Если у Вас отмечаются нежелательные реакции, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы острой передозировки витамином А (развиваются через 6 ч после введения): у взрослых - сонливость, вялость, диплопия, головокружение, сильная головная боль, тошнота, неукротимая рвота, диарея, раздражительность, осте-опороз, кровоточивость десен, сухость и изъявление слизистой оболочки полости рта, шелушение губ, кожи (особенно ладоней), возбуждение, спутанность созна-ния, повышение внутречерепного давления, у детей грудного возраста - гидроэн-цефалия, выпячивание родничка. Симптомы хронической интоксикации витамином А: анорексия, боль в костях, трещины и сухость кожи, губ, сухость слизистой оболочки полости рта, гастрал-гия, рвота, гипертермия, астения, головная боль, фотосенсибилизация, поллаки-урия, никтурия, полиурия, раздражительность, выпадение волос, желто- оранже-вые пятна на подошвах, ладонях, в области носогубного треугольника, гепатоток-сические явления, повышение внутриглазного давления, олигоменорея, порталь-ная гипертензия, гемолитическая анемия, изменения на рентгенограммах костей, судороги: фетотоксические явления: пороки развития мочевыделительной систе-мы, задержка роста, раннее закрытие эпифизарных зон роста. Кроме того, передозировка препаратом Гексавит может сопровождаться следую-щими симптомами: тошнота, мышечная слабость, боль в области печени, пожел-тевшая кожа, раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, ме-теоризм, абдоминальная боль спастического характера, учащенное мочеиспуска-ние. Лечение: временное прекращение приема препарата, промывание желудка, прием активированного угля внутрь, симптоматическое лечение. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучалось. Если ли Вы применяйте одновременно какие-либо другие лекарственные препа-раты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Гексавит рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Возможное окрашивание мочи в интенсивный желтый цвет, что обусловлено наличием рибофлавина в составе препарата и не представляет опасности. Не принимать одновременно с другими витаминными препаратами во избежание передозировки. Не превышать максимальные сроки и рекомендованные дозы при самостоятельном применении препарата. В случае отсутствия уменьшения или при утяжелении симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.