Инструкция по применению
Гексавит Драже 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Драже
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины
Количество в упаковке: 1



Описание

Драже шарообразной формы от желто-оранжевого до зеленовато-желтого цвета, со слабым характерным запахом.

Действующее вещество

Поливитамины

Состав

Состав на одно драже: Действующие вещества: Ретинола пальмитат (витамин А) - 2,75 мг (5000 МЕ) Аскорбиновая кислота - 70,00 мг Никотинамид - 15,00 мг Пиридоксина гидрохлорид - 2,00 мг Тиамина гидрохлорид - 2,00 мг Рибофлавин - 2,00 мг Вспомогательные вещества: Сахароза (сахар белый) - 787,979 мг Мука пшеничная - 59,073 мг Патока крахмальная - 57,050 мг Тальк - 1,380 мг Вазелиновое масло (парафин жидкий) - 0,260 мг Воск пчелиный - 0,260 мг Ароматизатор пищевой "Лимон" - 0,049 мг Краситель хинолиновый желтый Е 104 - 0,199 мг Масса драже: - 1000,0 мг (1,0 г)

Форма выпуска

Драже

Показания

Профилактика дефицита витаминов, входящих в состав препарата.

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды - по 1 драже 2-3 раза в день. Длительность применения препарата - 1 месяц. Повторные курсы возможны после консультации с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гипервитаминоз, желчнокаменная болезнь, хронический панкреатит, беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет. Врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, сахарозо-изомальтазная недостаточность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы: тошнота, мышечная слабость, боль в области печени, пожелтевшая кожа, раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, метеоризм, абдоминальная боль спастического характера, учащенное мочеиспускание. Лечение: промывание желудочно-кишечного тракта, прием активированного угля, назначение симптоматической терапии.

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучалось.

Особые указания

Не превышать рекомендованную суточную дозу. Не принимать одновременно другие поливитаминные комплексы во избежание передозировки. Возможно окрашивание мочи в ярко-желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в составе препарата рибофлавина.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 оС. Хранить в недоступном для детей месте.