Инструкция по применению
Гексавит-марбиофарм драже N50

Характеристики

Форма выпуска: Драже
Страна: Россия
Производитель: Марбиофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины
Количество в упаковке: 50



Описание

Комплексный поливитаминный препарат, действие которого обусловлено эффектами входящих в его состав витаминов.Ретинола пальмитат (витамин А) - жирорастворимый витамин, играет важную роль в окислительно-восстановительных процессах, участвует в синтезе мукополисахаридов, белков, липидов. Способствует нормальному спермато- и овогенезу, развитию плаценты, росту, нормальному развитию и дифференцировки эмбриональных тканей, в т.ч. эпителиальных структур и костной ткани. Участвует в формировании зрительных пигментов, необходимых для нормального сумеречного и цветового зрения; обеспечивает целостность эпителиальных тканей, регулирует рост костей.Тиамина гидрохлорид (витамин В1) - в качестве коэнзима участвует в углеводном обмене, функционировании нервной системы.Рибофлавин (витамин В2) - важнейший катализатор процессов клеточного дыхания и зрительного восприятия.Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) - в качестве коэнзима принимает участие в белковом обмене и синтезе нейромедиаторов. Никотинамид - участвует в процессах тканевого дыхания, жирового и углеводного обмена.Аскорбиновая кислота (витамин С) – участвует в окислении ряда биологически активных веществ, регуляции компонентов соединительной ткани, углеводного обмена, свертываемости крови и регенерации (восстановлении) тканей; стимулирует образование стероидных гормонов; нормализует проницаемость капилляров.

Действующее вещество

Поливитамины

Состав

активное вещество: гидрокортизона ацетат (в пересчете на 100% вещество) -25 мгвспомогательные вещества: пропиленгликоль — 0,2 мл, сорбитол — 20 мг, повидон — 10 мг, натрия хлорид — 1,4 мг, спирт бензиловый — 0,015 мл, вода для инъекций — до 1 мл

Форма выпуска

Драже

Показания

Профилактика и лечение гиповитаминозов.Применяют для повышения сопротивляемости организма к инфекционным и простудным заболеваниям, для улучшения остроты зрения у лиц, работа которых требует повышенного внимания, при длительном лечении антибиотиками.

Способ применения и дозы

Драже «Гексавит» назначают после еды для профилактики гиповитаминозов по 1 драже в день, в остальных случаях – взрослым - по 1 драже 3 раза в день, детям: от 3 до 7 лет - по 1 драже 2 раза в день, старше 7 лет – по 1 драже 3 раза в день.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не принимать при беременности.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.