Инструкция по применению
Гексо Бронхо® Сироп 100 мг/5 мл 150 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Франция
Производитель: Фамар Хелс Кеа Сервисез Мадрид
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гвайфенезин
Количество в упаковке: 1



Описание

Боль в горле редко приходит одна – около 70 % людей1, испытывающих этот неприятный симптом, также жалуются на кашель. Такое сочетание признаков ОРВИ или простуды может существенно замедлить выздоровление и ухудшить общее самочувствие. Причина проста: боль и першение в горле могут провоцировать кашель, а он, в свою очередь, усиливает раздражение в слизистой оболочке горла, что продлевает воспалительный процесс. Поэтому при появлении данных симптомов следует бороться не только с неприятными ощущениями в горле, но с их спутником, кашлем. Препарат Гексо Бронхо® предназначен для лечения кашля у взрослых и детей начиная с 12-летнего возраста. Он представлен в виде сиропа с приятным малиновым вкусом и выпускается во флаконе объемом 150 мл, который для удобства укомплектован мерным стаканчиком. Одним из достоинств Гексо Бронхо® является то, что он действует одновременно на 2 уровнях2 – в верхних и нижних отделах дыхательных путей. Гексо Бронхо® – это уникальный3 препарат от кашля, который обладает смягчающим и успокаивающим действием при проглатывании. Он смягчает слизистую оболочку горла, облегчая раздражение и помогая снизить першение и боль, которые провоцируют кашель. В нижних отделах дыхательных путей действующее вещество (гвайфенезин) способствует более легкому отхождению мокроты и очищению легких. Такое двухуровневое2 действие позволяет быстро4 устранить кашель – сироп способствует началу действия уже через 15 минут4 после приема. Быстрое действие и удобство приема (по 10 мл 4 раза в день) – это возможность бороться с кашлем именно тогда, когда вам это нужно, при любых обстоятельствах и условиях – в дороге, дома, на работе. Следует помнить, что при различных признаках недомогания, в том числе при кашле, нужно проконсультироваться с врачом, который выяснит причину ваших жалоб и назначит соответствующее лечение. А перед приемом Гексо Бронхо® также не забудьте внимательно ознакомиться с инструкцией к препарату.

Действующее вещество

Гвайфенезин

Состав

5 мл сиропа содержат: действующее вещество: гвайфенезин – 100,0 мг; вспомогательные вещества: левоментол – 1,10 мг, раствор глюкозы – 3492,0 мг, сахароза – 999,0 мг, этанол 96 % – 0,2595 мл, глицерол – 197,0 мг, натрия цитрат – 57,0 мг, натрия сахаринат – 15,0 мг, натрия бензоат – 10,0 мг, лимонной кислоты моногидрат – 12,0 мг, краситель карамель – 6,75 мг, подсластитель натуральный – 2,50 мг, ароматизатор малиновый – 2,28 мг, карбомер 974P – 0,250 мг, краситель пунцовый [Понсо 4R] – 0,250 мг, вода очищенная – q.s. до 5 мл. Описание: прозрачная жидкость красного цвета с характерным запахом, свободная от посторонних включений.

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

Гвайфенезин хорошо всасывается из ЖКТ при приеме внутрь. У здоровых взрослых добровольцев максимальная концентрация в крови (Cmax) и время достижения максимальной концентрации в крови (TCmax) после приема внутрь 600 мг гвайфенезина составили приблизительно 1,4 мкг/мл и 15 минут, соответственно. Период полувыведения (T1/2) составил около 1 часа, препарат не определялся в крови примерно через 8 часов. Гвайфенезин метаболизируется в печени. Выводится главным образом почками.

Показания

Симптоматическая терапия кашля, сопровождающегося затрудненным отхождением мокроты.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослые и дети старше 12 лет: наполнить мерный стаканчик до отметки 10 мл и принимать по 10 мл (200 мг гвайфенезина) 4 раза в сутки. Максимальная суточная доза – 40 мл (800 мг гвайфенезина).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения, детский возраст до 12 лет. Период грудного вскармливания. Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данных о применении лекарственного препарата «Гексо Бронхо» у беременных женщин недостаточно. Поэтому не рекомендуется применять лекарственный препарат во время беременности, за исключением случаев, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Данные о проникновении гвайфенезина в грудное молоко отсутствуют, поэтому на период лечения грудное вскармливание следует прекратить.

Побочные действия

Нежелательные реакции, выявленные при пострегистрационном применении лекарственного препарата, были классифицированы следующим образом: очень частые (≥1/10), частые (≥1/100, <1/10), не частые (≥1/1000, <1/100), редкие (≥1/10000, <1/1000), очень редкие (<1/10000), частота неизвестна (частота возникновения не может быть оценена на основании имеющихся данных). Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Очень редко: боль в животе, диарея, тошнота, рвота. Нарушения со стороны иммунной системы. Очень редко: реакции повышенной чувствительности (в том числе зуд и крапивница), сыпь. Нарушения со стороны нервной системы. Очень редко: головокружение, головная боль, сонливость.

Передозировка

Симптомы Симптомами передозировки являются абдоминальный дискомфорт (изжога, тошнота, рвота), сонливость. Лечение Лечение симптоматическое и поддерживающее.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, в том числе с кодеинсодержащими препаратами. Совместим с бронхолитиками, антибактериальными средствами и другими препаратами, принимаемыми при лечении бронхолегочных заболеваний.

Особые указания

Не следует принимать лекарственный препарат для лечения постоянного или хронического кашля, кашля при бронхиальной астме и кашля, сопровождающегося избыточной секрецией мокроты, за исключением случаев, когда применение препарата рекомендовано врачом. Если после 3–5 дней приема препарата кашель сохраняется или наряду с кашлем отмечаются повышение температуры, сыпь, длительная головная боль, следует проконсультироваться с врачом. Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов в одной дозе лекарственного препарата соответствует 0,75 хлебной единицы (ХЕ). Лекарственный препарат « Гексо Бронхо» содержит этанол 96 % (0,5 мл/10 мл сиропа). Содержание этанола следует учитывать пациентам, страдающим алкоголизмом, женщинам в период беременности и грудного вскармливания, детям и лицам, относящимся к группам повышенного риска, таким как пациенты с заболеваниями печени, эпилепсией, черепно-мозговой травмой, заболеваниями головного мозга. Метаболит гвайфенезина может вызывать изменение цвета при определении 5-гидроксииндолуксусной кислоты и ванилилминдальной кислоты в моче. Прием лекарственного препарата следует прекратить за 24 часа до сбора мочи для данного анализа. Если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности, не выливайте его в сточные воды и не выбрасывайте на улицу! Поместите лекарственное средство в пакет и положите в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду! ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И УПРАВЛЕНИЮ МЕХАНИЗМАМИ Во время терапии препаратом «Гексо Бронхо» необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с другими техническими устройствами, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, в связи с возможностью развития головокружения и содержанием этанола.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. СРОК ГОДНОСТИ 2 года. Не использовать препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.