Инструкция по применению
Геладринк Плюс Порошок для приготовления раствора для приема внутрь со вкусом апельсина 340 г

Характеристики



Форма выпуска: Порошок
Страна: Чехия
Производитель: Орлинг
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Геладринк Плюс-активное питание тканей суставов и позвоночника; повышение качества жизни при заболеваниях опорно-двигательного аппарата; улучшение состояния кожи, волос, ногтей. Геладринк Плюс способствует улучшению функционального состояния опорно-двигательного аппарата (ОДА), содержит комбинацию артро- и хондронутрицевтиков: коллагеновый гидролизат, глюкозамин и хондроитин сульфаты, а также основные минералы и витамины, которые защищают и питают все элементы опорно-двигательного аппарата (ОДА). Коллагеновый гидролизат Является источником "строительного материала" для хрящей, связок и сухожилий. Способствует регенерации соединительнотканных элементов ОДА, стимулируя образование физиологического коллагена. Коллаген составляет основу соединительной ткани человека (хрящей, костей, связок, сухожилий, кожи, и др.) и обеспечивает её прочность. Коллагеновый гидролизат содержит в большом количестве аминокислоты (пролин, гидроксипролин, глицин), коллагеновые пептиды и биогенный трипептид - глицин-гистидин-лизин, которые обладают способностью оказывать положительное влияние на деятельность хрящевых и костных клеток, стимулируя синтез ими физиологического коллагена и других веществ, создающих хрящевую и костную матрицу. Глюкозамин сульфат Обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, стимулирует биосинтез аминогликанов и способствует восстановлению хрящевых поверхностей суставов. Одновременно с этим нормализуется продукция внутрисуставной жидкости, что приводит к уменьшению

дегенеративных изменений и болезненности в суставах, улучшает их подвижность и механико-эластические свойства. Стимулирует хондроциты на увеличение производства нормального коллагена и протеогликанов. Хондроитин сульфат Способствует поддержанию упругости и эластичности хряща. Входит в состав синовиальной жидкости, которая влияет на гидратацию суставных хрящей и обеспечивает ее нормальные амортизационные свойства. Хондроитин обладает противовоспалительной активностью, стимулирует синтез гиалуроновой кислоты и протеогликанов, ингибирует действие протеолитических ферментов. Метилсульфонилметан (МСМ) Способствует поддержанию упругости и эластичности хряща. Входит в состав синовиальной жидкости, которая влияет на гидратацию суставных хрящей и обеспечивает ее нормальные амортизационные свойства. Хондроитин обладает противовоспалительной активностью, стимулирует синтез гиалуроновой кислоты и протеогликанов, ингибирует действие протеолитических ферментов. Является источником органических соединений серы. Участвуя в создании структуры коллагеновых волокон, сера способствует правильному формированию хрящевых и костных тканей. МСМ затормаживает перенос болезнетворных импульсов, ограничивает протекание воспалительных процессов в суставных тканях, поддерживает циркуляцию крови, ограничивает процессы образования отеков, улучшает питание суставных клеток, способствует релаксации мышечной ткани около позвоночника и купирует судорожные явления. Оказывает эффективное антиоксидантное действие. Кальций Основной минерал организма. Участвует в процессах передачи нервных импульсов, мышечного сокращения и др. Соли кальция являются основными минеральными элементами костей, придающими им необходимую прочность. В составе препарата кальций представлен в виде хлорида, который имеет наибольшую растворимость в воде и, следовательно, наилучшее усвоение организмом человека. Медь Играет важную роль в антиоксидантной защите организма, обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами. Этот микроэлемент принимает участие в формировании структуры белков соединительной ткани - коллагена и эластина, которые являются структурными компонентами костной и хрящевой ткани, кожи, легких, стенок кровеносных сосудов. Недостаток меди приводит к деминерализации костной ткани и остеопорозу. Марганец и магний Микроэлементы, значительно влияющие на метаболизм коллагена, хондроитин сульфата и глюкозамин сульфата. Играют важную роль в процессах восстановления соединительных тканей. Витамин С - сильнейший антиоксидант, стимулирующий коллагенообразование в соединительных тканях. Витамин С Является регулятором окислительно-восстановительных процессов, участвует в регенерации тканей, синтезе стероидных гормонов, коллагена, проколлагена. Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие. Витамин В6 (пиридоксин) Необходим для нормального функционирования центральной и периферической нервной системы. В

фосфорилированной форме пиридоксин является коферментом большого количества ферментов, действующих на анаэробный обмен аминокислот (процессы декарбоксилирования, переаминирования и др.). Биотин (витамин Н) Серосодержащий витамин, играет важную роль в метаболизме соединительной ткани. Влияет на состояние кожи и ее производных (волос, ногтей и др.). При недостатке биотина в пище или нарушениях его всасываемости наблюдаются сухость кожи и ее шелушение, депрессии, апатия.

Состав

В суточной дозе (12 г) содержится: коллагеновый гидролизат - 9,5 г.; глюкозамин сульфат 200 мг; хондроитин сульфат 100 мг; метилсульфонилметан 100 мг; кальций 80 мг; магний 30 мг;   марганец 1 мг; медь 1 мг; витамин С 60 мг; витамин В6 1 мг; биотин 300 мкг.

Форма выпуска

Порошок

Показания

Для профилактики и коррекции заболеваний суставов и позвоночника человека. Защита, питание и восстановления элементов опорно-двигательной системы - хрящей, костей, связок и сухожилий. Профилактика и дополнительное лечение при таких расстройствах и заболеваниях ОДА, как деформирующие остеоартрозы, артрозо-артриты, ревматические полиартриты, остеохондроз позвоночника, миозиты, тендиниты, спондилиты, спондилезы, благодаря чему снижается необходимость применения противовоспалительных препаратов и анальгетиков. Восстановление нормальных функций опорно-двигательного аппарата при ушибах, ранах, растяжениях и других травмах суставов

Способ применения и дозы

Суточная доза для взрослых и детей от 12 лет - 12 г (одна мерка) порошка. Отмерить Геладринк Плюс меркой, входящей в комплект, растворить в 200 - 250 мл холодной воды или молока, размешивая приложенной ложечкой и выпить после полного растворения.Минимальный рекомендуемый курс - 2 месяца. Для достижения устойчивого эффекта рекомендуется 2-3 раза в год.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, фенилкетонурия, беременность, кормление грудью.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан во время беременности и лактации.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, диспептические явления.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении