Инструкция по применению
Гельминтокс таблетки 125 мг 6 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Франция
Производитель: Innothera Chouzy
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Пирантел
Количество в упаковке: 6
Дозировка действующего вещества: 125 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Пирантел

Состав

Пирантела эмбонат 360.5 мг,;что соответствует содержанию пирантела 125 мг; Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный прежелатинизированный - 34 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 18.5 мг, магния стеарат - 7 мг.;Состав пленочной оболочки: Сепифилм 002 (гипромеллоза, метилгидроксипропилцеллюлоза, макрогола 400 моностеарат) - 12.5 мг, Сеписперс AP3065 желтый (пропиленгликоль, титана диоксид (E171), краситель солнечный закат желтый (E110)) - 7.5 мг, тальк - 100 мкг.

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Фармакокинетика

Практически не абсорбируется из ЖКТ. После приема разовой дозы 10 мг/кг концентрация в плазме составляет 0.005-0.13 мкг/мл и достигается в течение 1-3 ч. Метаболизируется частично в печени до N-метил-1,3-пропандиамина. Выводится в неизмененном виде через кишечник (около 93%), 7% выводится почками в неизмененном виде или в виде метаболита.

Показания

Аскаридоз, анкилостомидоз, некатороз, трихоцефалез.

Способ применения и дозы

При аскаридозе и энтеробиозе применяют однократно в дозе 10 мг/кг. При сочетании некатороза с аскаридозом или других сочетанных гельминтных поражениях применяют в течение 3 дней подряд в дозе 10 мг/кг/сут или в течение 2 дней - в дозе 20 мг/кг/сут.

Противопоказания

Беременность, повышенная чувствительность к пирантелу, миастения (период лечения).

Применение при беременности и кормлении грудью

Пирантел противопоказан к применению при беременности.;При необходимости применения в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея, анорексия, повышение активности печеночных трансаминаз.;Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: головная боль, галлюцинации, спутанность сознания, парестезии, головокружение, сонливость или бессонница.;Дерматологические реакции: кожная сыпь, крапивница.;Прочие: нарушение слуха, гипертермия.

Взаимодействие с другими препаратами

Не следует назначать одновременно с пиперазином (ослабление действия).;При одновременном применении пирантел повышает концентрацию теофиллина в плазме.

Особые указания

С осторожностью применять при печеночной недостаточности.;После приема пирантела слабительные средства не назначают.;При энтеробиозе следует провести одновременное лечение всех совместно проживающих лиц. После завершения лечения необходимо провести контрольное исследование кала на наличие яиц паразитов.;С осторожностью назначают детям в возрасте до 6 месяцев.

Условия хранения

В сухом месте