Инструкция по применению
Гемцитабин-Эбеве концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг /мл 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Концентрат
Страна: Индия
Производитель: Сандоз
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гемцитабин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1000 мг



Действующее вещество

Гемцитабин

Состав

Концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мл гемцитабин 10 мг.

Форма выпуска

Концентрат

Показания

Немелкоклеточный рак легкого (IIIa-IV стадии). Поздние карциномы поджелудочной железы.

Способ применения и дозы

Устанавливают индивидуально, в зависимости от показаний и стадии заболевания, состояния системы кроветворения, схемы противоопухолевой терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к гемцитабину.

Применение при беременности и кормлении грудью

Безопасность гемцитабина при беременности у человека не изучена. В экспериментальных исследованиях показано, что гемцитабин оказывает эмбрио- и фетотоксическое действие, негативно влияет на течение беременности и постнатальное развитие. Следует избегать применения гемцитабина при беременности. Женщинам детородного возраста в период лечения необходимо использовать надежные методы контрацепции. При необходимости применения в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Побочные действия

Со стороны системы кроветворения: лейкопения, тромбоцитопения, анемия. Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея . Редко - запор. Со стороны мочевыделительной системы: протеинурия, гематурия. Редко периферические отеки. В единичных случаях почечная недостаточность. Дерматологические реакции: кожная сыпь, зуд, алопеция, стоматит. Редко шелушение, везикулезная сыпь, экзема. Со стороны лабораторных показателей: транзиторное повышение активности печеночных трансаминаз, ЩФ, увеличение концентрации билирубина в плазме. Со стороны дыхательной системы: Редко бронхоспазм, одышка. Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: Редко сонливость, слабость, парестезии. Со стороны сердечно-сосудистой системы: Редко артериальная гипотензия, отек легких. В единичных случаях инфаркт миокарда, аритмии. Прочие: гриппоподобный синдром.

Особые указания

Со стороны системы кроветворения: лейкопения, тромбоцитопения, анемия. Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея . Редко - запор. Со стороны мочевыделительной системы: протеинурия, гематурия. Редко периферические отеки. В единичных случаях почечная недостаточность. Дерматологические реакции: кожная сыпь, зуд, алопеция, стоматит. Редко шелушение, везикулезная сыпь, экзема. Со стороны лабораторных показателей: транзиторное повышение активности печеночных трансаминаз, ЩФ, увеличение концентрации билирубина в плазме. Со стороны дыхательной системы: Редко бронхоспазм, одышка. Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: Редко сонливость, слабость, парестезии. Со стороны сердечно-сосудистой системы: Редко артериальная гипотензия, отек легких. В единичных случаях инфаркт миокарда, аритмии. Прочие: гриппоподобный синдром.