Инструкция по применению
Гемодез-Н Раствор для инфузий 200 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: КУРСКАЯ БИОФАБРИКА
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Калия хлорид+Кальция хлорид+Магния хлорид+Натрия гидрокарбонат+Натрия хлорид+Повидон-8 тыс.
Количество в упаковке: 1

Описание

Раствор для инфузий Гемодез — плазмозамещающий препарат, выводящий из организма отравляющие вещества. Применяется в виде капельниц.

Действующее вещество

Калия хлорид+Кальция хлорид+Магния хлорид+Натрия гидрокарбонат+Натрия хлорид+Повидон-8 тыс.

Состав

Повидон (поливинилпирролидон) низкомолекулярный медицинский, хлорид натрия, хлорид калия, хлорид кальция, гидрокарбонат натрия, хлорид магния безводный, вода для инъекций.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

Метаболическим превращениям в организме не подвергается. Препарат выводится почками за 12–13 ч.

Показания

При токсических формах острых инфекционных кишечных заболеваний (дизентерия, сальмонеллез и т.д.), как средство дезинтоксикации в послеоперационном периоде при перитоните, при заболеваниях печени, сопровождающихся развитием печеночной недостаточности, при ожоговой болезни, сепсисе, а также гемолитической болезни новорожденных, внутриутробной инфекции и токсемии новорожденных.

Способ применения и дозы

Перед введением раствор подогревают до температуры тела. Вводят внутривенно капельно со скоростью 40–80 кап/мин. Разовая доза зависит от возраста больного и тяжести интоксикации. Для взрослых максимальная разовая доза — 400 мл. Детям начинают с 2,5 мл/кг. Максимальная разовая доза для детей грудного возраста — 50 мл, для детей 2–5 лет — 70 мл, для детей 6–9 лет — 100–150 мл, для детей 10–15 лет — 200 мл.При острых желудочно-кишечных инфекциях, ожоговой и лучевой болезнях вводят 1-2 раза в сутки, при гемолитической болезни и токсемии новорожденных - 2-8 раз в сутки (ежедневно или через день), при крупноочаговом инфаркте миокарда (в 1-е сутки) - 200 мл однократно, при осложнениях на 2-е сутки - 200 мл.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, кровоизлияния в мозг, сердечно-сосудистая недостаточность, тромбоэмболия, острый нефрит, бронхиальная астма, флеботромбоз.

Побочные действия

Снижение АД, тахикардия, затруднение дыхания (при быстром введении), аллергические реакции различной степени тяжести (вплоть до развития анафилактического шока). В этих случаях необходимо немедленно прекратить инфузию, провести симптоматическую терапию (ввести антигистаминные, кардиотонические, вазопрессорные препараты, глюкокортикоиды).

Особые указания

Замораживание не влияет на качество препарата. Флаконы с замерзшим раствором выдерживают при комнатной температуре до оттаивания и содержимое перемешивают.