Инструкция по применению
Гемодез-Н Раствор для инфузий флакон 400 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: КУРСКАЯ БИОФАБРИКА
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Калия хлорид+Кальция хлорид+Магния хлорид+Натрия гидрокарбонат+Натрия хлорид+Повидон-8 тыс.
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачная жидкость светло-желтого или желтого цвета.

Действующее вещество

Калия хлорид+Кальция хлорид+Магния хлорид+Натрия гидрокарбонат+Натрия хлорид+Повидон-8 тыс.

Состав

Повидон (поливииилпирролидон низкомолекулярный медицинский 8000 ± 2000 для изготовления препарата Гемодез-Н) в пересчете на безводный - 60 г Натрия хлорид - 5,50 г Калия хлорид - 0,42 г Кальция хлорид гексагидрат - 0,50 г Магния хлорид гексагидрат - 0,005 г Натрия гидрокарбонат - 0,23 г Воды для инъекций -до 1 л.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Шок (посттравматический, послеоперационный, ожоговый, геморрагический), интоксикация (токсические заболевания желудочно-кишечного тракта: дизентерия, диспепсия, салмонеллёз) как средство дезинтоксикации в послеоперационном периоде перитониты заболевания печени, сопровождающиеся развитием почёночной недостаточности непроходимость кишечника тиреотоксикоз ожоговая болезнь острая лучевая болезнь, сепсис, пневмония острая фаза инфаркта. миокарда гемолитическая болезнь новорожденных внутриутробная инфекция и токсемия новорожденных токсикоз беременных.

Способ применения и дозы

Внутривенно капельно со скоростью от 40 до 80 капель в минуту, через устройство с фильтром. Доза зависит от возраста больного и тяжести интоксикации. Разовая доза для взрослых - от 200 до 500 мл для детей от 5 до 10 мл/кг. Максимальная разовая доза для детей грудного возраста - от 50 до 70 мл в возрасте от 2 до 5 лет - 100 мл от 5 до 10 лет - 150 мл от 10 до 15 лет - 200 мл. Препарат вводят однократно или повторно (до 2 раз в сутки) в течение от 1 до 10 дней, в зависимости от тяжести интоксикации. При острых желудочно- кишечных инфекциях, ожоговой и лучевой болезнях вводят от 1 до 2 раз в сутки при гемолитической болезни и токсемии новорожденных - от 2 до 8 раз в сутки (ежедневно или через день) при крупноочаговом инфаркте миокарда (в первые сутки) - 200 мл однократно, при осложнениях на вторые сутки - 200 мл.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, внутричерепная гипертензия, геморрагический инсульт, состояние после черепно-мозговой травмы, сердечно-сосудистая недостаточность IIб - III степени, дыхательная недостаточность, тяжёлые аллергические реакции, тромбоэмболия, олигурия, анурия, острый нефрит, бронхиальная астма, флеботромбоз.

Побочные действия

При медленном введении Гемодез-Н обычно осложнений не вызывает. Введение с повышенной скоростью может вызвать снижение артериального давления, тахикардию, затруднение дыхания и потребовать введения сосудосуживающих и сердечных средств, кальция хлорида. У отдельных больных возможно возникновение аллергических реакций, вплоть до развития анафилактического шока. В этих случаях следует немедленно прекратить инфузию, провести симптоматическую терапию (ввести антигйстамйнные, кардиотонические средства, глюкокортикоиды, вазопрессивные препараты).

Передозировка

При передозировке препарат следует отменить и провести симптоматическую терапию.

Особые указания

При обширных ожогах сочетают с введением плазмы, альбумина, гаммаг- лобулина. Перед началом инфузии врач обязан проверить герметичность и целостность упаковки. Препарат должен быть прозрачен, не содержать взвеси, осадка и плесени. Результаты визуального осмотра регистрируются в истории болезни. Перед введением раствор подогревают до температуры тела.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Замораживание препарата при условии сохранения герметичности бутылки, а также несмачиваемость внутренней поверхности ее стенки не являются основанием для отказа от его применения.