Инструкция по применению
Гендевит драже 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Драже
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины
Количество в упаковке: 50

Описание

Гендевит – поливитаминное средство, используют в целях профилактики гиповитаминоза. Выпускается в форме драже от желто-оранжевого до оранжевого цвета шарообразной формы со слабым характерным запахом. Фармакологическое действие препарата обусловлено свойствами, входящих в его состав витаминов. Ретинол обеспечивает нормальную функцию кожи, слизистых оболочек, а также функцию зрения. Тиамин участвует в углеводном обмене и функционировании нервной системы. Рибофлавин - катализирует процессы клеточного дыхания и зрительного восприятия. Цианокобаламин является важным фактором роста и развития эпителиальных клеток. Аскорбиновая кислота участвует в формировании и поддержании структуры и функции хрящей, костей, зубов, улучшает всасывание в кишечнике и усвоение организмом железа. Никотинамид участвует в процессах тканевого дыхания, жирового и углеводного обмена. Фолиевая кислота принимает участие в синтезе аминокислот, нуклеотидов, нуклеиновых кислот. Токоферол обладает антиоксидантными свойствами. Кальция пантотенат способствует построению, регенерации эпителия и эндотелия. Отпускают без рецепта.

Действующее вещество

Поливитамины

Состав

Действующие вещества: Ретинола пальмитат (витамин А) (в виде масляной жидкости, содержащей ретинола пальмитат (1 млн МЕ/г) - 3300 МЕ, d,l-альфа-токоферол - 0,033 мг, арахисовое масло - 1,4355 мг) - 1,817 мг (3300 МЕ) Тиамина гидрохлорид (витамин В1) - 1,50 мг Рибофлавин (витамин В2) - 1,50 мг Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) - 2,00 мг Цианокобаламин (витамин В12) - 10,00 мкг Аскорбиновая кислота (витамин С) - 75,00 мг Никотинамид - 10,00 мг Фолиевая кислота - 0,30 мг - Токоферола ацетат (витамин Е) - 5,00 мг Эргокальциферол (витамин D2) (в виде маслянистой жидкости, содержащей эргокальциферол - 250 МЕ, соевых бобов масло рафинированное, дезодорированное до 0,00125 мл) - 6,25 мкг (250 МЕ) Кальция пантотенат - 3,00 мг Вспомогательные вещества: сахароза - 757,04675 мг, мука пшеничная - 78,70 мг, патока крахмальная - 63,03 мг, тальк - 0,50 мг, подсолнечное масло - 0,20 мг, мяты перечной листьев масло - 0,15 мг, воск пчелиный - 0,10 мг, краситель хинолиновый желтый (Е-104) - 0,10 мг, краситель тропеолин-О - 0,04 мг.

Форма выпуска

Драже

Показания

Профилактика гиповитаминоза.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь после еды. Взрослым по 1 драже в сутки. Курс лечения 20-30 дней. Перерывы между курсами 1-3 месяца, повторные курсы по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гипервитаминоз, врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, сахарозоизомальтозная недостаточность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Рекомендовано принимать внутрь, по назначению врача. При беременности и в период грудного вскармливания принимать по 1 драже в день.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Не рекомендуется превышать указанные дозы.

Взаимодействие с другими препаратами

Если Вы принимаете какие-либо другие лекарственные препараты, проконсультируйтесь с врачом о возможности применения и дозах препарата.

Особые указания

Не принимать одновременно с другими витаминными препаратами во избежание передозировки. Не превышать рекомендованной суточной дозы, при случайном приеме высоких доз следует немедленно обратиться к врачу.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.