Инструкция по применению
Гентамицин-АКОС Мазь для наружного применения 0,1 % 15 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Синтез
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гентамицин
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36



Действующее вещество

Гентамицин

Состав

100 г мази содержит: Активное вещество: гентамицина сульфат (в пересчете на гентамицин)- 0,1 г Вспомогательные вещества: парафин нефтяной твердый - 5,0 г, вазелин медицинский - до 100 г.

Форма выпуска

Мазь

Показания

Бактериальные инфекции кожи и мягких тканей вызванные чувствительной микрофлорой - пиодермия (в т.ч. гангренозная) поверхностный фолликулит фурункулез сикоз паронихия. Инфицированные: дерматиты (в т.ч. контактный себорейный и экзематозный) язвы (в т.ч. варикозные) раны (в т.ч. хирургические вялозаживающие) ожоги (в т.ч. растениями) укусы насекомых абсцессы кожи и кисты "вульгарные" угри; вторичное бактериальное инфицирование при грибковых и вирусных инфекциях кожи.

Способ применения и дозы

Наносят тонким слоем на пораженное место 3–4 раза в сутки.

Противопоказания

Гиперчувствительность (в т.ч. к др. аминогликозидам в анамнезе). С осторожностью: При необходимости применения на обширных поверхностях кожи - неврит слухового нерва миастения паркинсонизм ботулизм почечная недостаточность (в т.ч. тяжелая хроническая почечная недостаточность с азотемией и уремией) период новорожденности недоношенность детей пожилой возраст беременность период лактации.

Побочные действия

Аллергические реакции: местные - кожная сыпь зуд гиперемия кожи чувство жжения; редко генерализованные - лихорадка ангионевротический отек эозинофилия. При всасывании с обширных поверхностей возможно развитие системных эффектов.

Взаимодействие с другими препаратами

Одновременно или сразу по окончанию курса лечения Гентамицином (при применении на больших поверхностях и/или в течение длительного времени) не следует назначать противомикробные и другие препараты оказывающие отонефротоксическое действие.

Особые указания

Лечение проводят под контролем антибиотикограммы препарата поскольку при длительном применении возможно развитие резистентности. В подобных случаях необходимо отметить лечение и начать проведение соответствующей терапии. При нанесении на большие поверхности кожи необходимо учитывать возможность резорбтивного действия особенно у пациентов с хронической почечной недостаточностью. Если в течение 1 нед отсутствует терапевтический эффект следует проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Список Б. При температуре от 8 °C до 15 °C. Хранить в местах недоступных для детей.