Инструкция по применению
Гентос Капли гомеопатические 20 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Австрия
Производитель: Биттнер Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Форма выпуска

Капли

Показания

В составе комплексной терапии: При острых и хронических заболеваниях предстательной железы (доброкачественная гиперплазия предстательной железы, простатит) для ослабления симптомов указанных заболеваний. При заболеваниях мочевого пузыря (цистит, атония мочевого пузыря).

Способ применения и дозы

ри хроническом простатите назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 3 мес. При воздействии провоцирующих факторов проводят двухнедельные профилактические курсы. При доброкачественной гиперплазии предстательной железы назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 3 мес. Затем назначают поддерживающую терапию 1-2 раза /сут в зависимости от выраженности дизурии. При остром цистите взрослым и подросткам назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 1-2 недели. При хроническом цистите назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут в течение 3 мес. Затем при необходимости переходят на поддерживающую терапию 1-2 раза/сут. При острых нарушениях мочеиспускания (частые позывы к мочеиспусканию, ночные позывы к мочеиспусканию, неполное опорожнение мочевого пузыря) взрослым и подросткам назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 2 недели. При хронических нарушениях назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут в течение 3 мес. Затем при необходимости переходят на поддерживающую терапию 1-2 раза/сут. В начале заболевания и в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен прием препарата по 8-10 капель или 1 таб. каждые 0,5-1 ч, но не более 8 раз/сут. После улучшения состояния препарат назначают 3 раза/сут. Препарат принимают за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи. Капли принимают в чистом виде или разводят в 1 столовой ложке воды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием. Таблетку следует держать под языком до полного рассасывания.

Противопоказания

Детский возраст до 12 лет (из-за недостаточности клинических данных). Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Вопрос о применении препарата Гентос при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) решается врачом индивидуально.

Побочные действия

Редко: повышенное слюноотделение. Пациент должен быть информирован о том, что при возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимое лекарственное взаимодействие препарата Гентос с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания

С осторожностью следует назначать препарат при заболеваниях щитовидной железы. Пациент должен быть информирован о том, что при заболеваниях предстательной железы следует проконсультироваться с врачом. Поскольку препарат Гентос в форме капель гомеопатических содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение раствора или ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и сильных электромагнитных полей месте, недоступном для детей.