Инструкция по применению
Гентос Таблетки подъязычные 40 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Австрия
Производитель: Биттнер Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 40
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

В 1-й таблетке (250 мг) содержится:Активные вещества: Осина канадская (Populus) D1- 25,0 мг, Пальма ползучая (Sabal) D6- 37,2 мг, Болиголов (Conium) D6- 37,2 мг, Калия иодид (Kalium iodatum) D12- 37,2 мг, Железа пикрат (Ferrum picrinicum) D12- 37,2 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Фармакокинетика

Действие препарата Гентос является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания

В комплексном лечении острых и хронических заболеваний предстательной железы (доброкачественная гиперплазия предстательной железы, простатит) для ослабления симптомов указанных заболеваний, при лечении заболеваний мочевого пузыря (атония мочевого пузыря, цистит).

Способ применения и дозы

При хроническом простатите назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 3 мес. При воздействии провоцирующих факторов проводят двухнедельные профилактические курсы.При доброкачественной гиперплазии предстательной железы назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 3 мес. Затем назначают поддерживающую терапию 1-2 раза/сут в зависимости от выраженности дизурии.При остром цистите взрослым и подросткам назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 1-2 недели.При хроническом цистите назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут в течение 3 мес. Затем при необходимости переходят на поддерживающую терапию 1-2 раза/сут.При острых нарушениях мочеиспускания (частые позывы к мочеиспусканию, ночные позывы к мочеиспусканию, неполное опорожнение мочевого пузыря) взрослым и подросткам назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 2 недели. При хронических нарушениях назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут в течение 3 мес. Затем при необходимости переходят на поддерживающую терапию 1-2 раза/сут.В начале заболевания и в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен прием препарата по 8-10 капель или 1 таб. каждые 0.5-1 ч, но не более 8 раз/сут. После улучшения состояния препарат назначают 3 раза/сут. Препарат принимают за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи. Капли принимают в чистом виде или разводят в 1 столовой ложке воды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием. Таблетку следует держать под языком до полного рассасывания.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Заболевания щитовидной железы (гипертериоз).

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности и в период лактации препарат применяется по назначению врача.

Побочные действия

На данный момент не зарегистрировано.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимое лекарственное взаимодействие препарата Гентос с другими лекарственными средствами не установлено.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении