Инструкция по применению
Гепабене Капсулы 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Германия
Производитель: Меркле ГмбХ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Экстракт сухой травы дымянки лекарственной+Экстракт плодов расторопши пятнистой
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 275.1 мг+83.1 мг

Действующее вещество

Экстракт сухой травы дымянки лекарственной+Экстракт плодов расторопши пятнистой

Состав

1 капсула содержит: активные компоненты: дымянки лекарственной травы экстракт сухой (соответствующий 4 13 мг суммы фумаровых алкалоидов в пересчете на протопин) 275 10 мг расторопши пятнистой плодов экстракт сухой (соответствующий 50 мг силимарина в т.ч. не менее 22 мг силибина)* 83 33-100 00 мг вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая (тип 102)* 63 20-79 87 мг крахмал кукурузный 20 10 мг тальк 8 40 мг макрогол-6000 4 50 мг коповидон 4 50 мг кремния диоксид коллоидный 2 10 мг магния стеарат 2 10 мг оболочка: желатин 79 94 мг краситель железа оксид желтый 0 67 мг краситель железа оксид красный 0 15 мг краситель железа оксид черный 0 04 мг титана диоксид 1 29 мг вода очищенная 13 92 мг. * Количество расторопши пятнистой плодов экстракта сухого зависит от его фактической активности и должно содержать 50 мг силимарина. Целлюлоза микрокристаллическая добавляется в количестве необходимом для компенсации и для получения содержимого капсулы с теоретической массой 480 00 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

После приема внутрь флаволигнаны входящие в состав силимарина подвергаются кишечно-печеночной рециркуляции экскретируются преимущественно с желчью и в меньшей степени почками.

Показания

Лекарственный препарат растительного происхождения для стимуляции секреции желчи и облегчения симптомов функциональной диспепсии таких как: чувство вздутия живота метеоризм. Применение препарата Гепабене основано на многолетнем опыте его использования по данному показанию.

Способ применения и дозы

Капсулы принимают внутрь перед приемом пищи не разжевывая запивая достаточным количеством воды. Взрослым препарат назначают по 1 капсуле 3 раза в сутки в течение двух недель. Если после лечения улучшение не наступает или симптомы усугубляются или появляются новые симптомы необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям тому способу применения и в тех дозах которые указаны в инструкции.

Противопоказания

повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата а также к другим растениям семейства астровых (сложноцветных) острые воспалительные заболевания печени желчекаменная болезнь острые и хронические заболевания желчевыводящих путей детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с отсутствием специальных исследований противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Возможно возникновение послабляющего действия и увеличение диуреза. Нет данных относительно частоты возникновения нежелательных явлений. Если у Вас отмечаются побочные эффекты указанные в инструкции или они усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. При случайном приеме высокой дозы необходимо вызвать рвоту промыть желудок принять активированный уголь провести при необходимости симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Исследования лекарственного взаимодействия препарата Гепабене не проводились. При совместном применении силимарина с пероральными контрацептивами и препаратами которые используются при гормональной заместительной терапии возможно уменьшение эффекта последних. Силимарин может усилить эффекты таких лекарственных средств как диазепам алпразолам кетоконазол ловастатин аторвастатин винбластин из-за его подавляющего действия на изоферменты системы цитохрома Р450. Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Гепабене проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Перед началом применения препарата необходимо проконсультироваться с врачом. Применение препарата противопоказано у детей и подростков до 18 лет так как отсутствуют данные о его применении у данной категории пациентов.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте!