Инструкция по применению
Гепафор Капсулы 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: ПроБиоФарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Расторопши экстракт сухой+Бифидобактерии+Лактобактерии
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 100 мг
Срок годности: 12.0

Действующее вещество

Расторопши экстракт сухой+Бифидобактерии+Лактобактерии

Состав

1 капс. содержит сухой экстракт расторопши (силимар) 0.1 гВспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный - 0.1-1 мг, магния стеарат - 0.4-4 мг, крахмал кукурузный - до 105 мг.Состав оболочки капсул: титана диоксид (белый цвет) - 2%, железа оксид (желтый цвет) - 0.05-1.8%, желатин - 96 мг.1 капс. содержит Bifidobacterium bifidum (сорбированные на кремния диоксиде коллоидном)не менее 50 млн.КОЕLactobacillus fermentum (сорбированные на кремния диоксиде коллоидном)не менее 50 млн.КОЕВспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный - 0.6 мг, магния стеарат - 1-10 мг, лактулоза - до 0.2 г.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Гепафор применяют взрослым всех возрастных групп в комплексной терапии при лечении:токсических поражений печени (в том числе лекарственных);острых и хронических гепатитов, в том числе лекарственных (включая развившиеся на фоне применения противотуберкулезных средств) и для восстановления нормофлоры кишечника;хронического гепатита разной этиологии, в том числе с нарушением функции желчевыводящих путей;цирроза печени;состояний после перенесенного гепатита;острых вирусных гепатитов.Препарат с профилактической целью применяют при хронических интоксикациях (в т.ч. профессиональных), длительном приеме лекарств и алкоголя.

Способ применения и дозы

Для лечения токсических поражений печени, хронического гепатита, цирроза печени, состояний после перенесенного гепатита, лекарственного гепатита и дисбактериоза кишечника на фоне применения противотуберкулезных и других противомикробныхсредств – по 2 капсулы 3 раза в день, курс 14 – 30 дней.Для лечения острых вирусных гепатитов – по 1 капсуле Гепафор 3 раза в день, курс 15 дней.Профилактически препарат применяют по 1 – 2 капсулы 3 раза в день, курс 14 – 30 дней.При необходимости курс повторяют через 1 – 3 месяца.Гепафор принимают внутрь во время приема пищи, запивая кипяченой водой комнатной температуры.

Противопоказания

Гепафор противопоказан при индивидуальной непереносимости.Данных о применении препарата в детском возрасте нет.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции и развитие послабляющего действия после приема препарата.

Передозировка

Случаев передозировки препаратом Гепафор не наблюдалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Гепафор можно принимать с другими лекарственными препаратами, включая антибиотики и химиотерапевтические препараты.

Условия хранения

Беречь от детей