Инструкция по применению
Гепар Композитум Раствор для инъекций 2,2 мл Ампулы 100 шт

Характеристики



Форма выпуска: Ампулы
Страна: Германия
Производитель: Арнебия
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 100

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

На одну ампулу 2,2 мл (= 2,2 г): Активные компоненты: Hepar suis D8 22 мкл, Cyanocobalaminum D4 22 мкл, Duodenum suis D10 22 мкл, Thymus suis D10 22 мкл, Colon suis D10 22 мкл, Vesica fellea suis D10 22 мкл, Pankreas suis D10 22 мкл, Cinchona pubescens D4 22 мкл, Lycopodium clavatum D4 22 мкл, Chelidonium majus D4 22 мкл, Silybum marianum D3 22 мкл, Histaminum D10 22 мкл, Sulfur D13 22 мкл, Avena sativa D6 22 мкл, Fel tauri D8 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum D10 22 мкл, Acidum a-ketoglutaricum D10 22 мкл, Acidum malicum D10 22 мкл, Acidum fumaricum D10 22 мкл, Acidum thiocticum D8 22 мкл, Acidum oroticum monohydricum D6 22 мкл, Cholesterolum D10 22 мкл, Calcium carbonicum Hahnemanni D28 22 мкл, Taraxacum officinale D4 22 мкл, Cynara scolymus D6 22 мкл, Veratrum album D4 22 мкл; Вспомогательные вещества: вода для инъекций 1628 мг, натрия хлорид для установления изотонии.

Форма выпуска

Ампулы

Показания

В комплексной терапии острых и хронических заболеваний печени и желчного пузыря. В комплексной терапии заболеваний кожи воспалительного и невоспалительного характера (токсическая экзантема, дерматоз, дерматит, нейродермит).

Способ применения и дозы

1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно. Курс терапии при острых заболеваниях 3-5 недель; при хронических заболеваниях не менее 4-8 недель. Терапию проводят под наблюдением врача.

Противопоказания

Вводят внутримышечно, подкожно 1-3 раза в неделю по 1 ампуле. Курс терапии при острых заболеваниях 3-5 недель . при хронических заболеваниях не менее 4-8 недель. Терапию проводят под наблюдением врача.

Применение при беременности и кормлении грудью

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом врачу.

Побочные действия

В редких случаях возможны кожные реакции. В таком случае терапию этим препаратом следует прекратить и проконсультироваться у лечащего врача.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. При превышении рекомендованных доз необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Назначение комплексных гомеопатических лекарственных средств не исключает применение при данном заболевании других лекарственных средств.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом врачу. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Отсутствуют данные о влиянии препарата на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора). Назначение комплексных гомеопатических лекарственных средств не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.