Инструкция по применению
Гепар композитум Раствор для внутримышечного и подкожного введения гомеопатический 2,2 мл 5 шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 5
Дозировка действующего вещества: 2.2 мл
Срок годности: 60

Описание

Биорегуляционный немецкий препарат. Применяется при в комплексной терапии острых и хронических заболеваний печени и желчного пузыря. В комплексной терапии заболеваний кожи воспалительного и невоспалительного характера (токсическая экзантема, дерматоз, дерматит, нейродермит).

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на одну ампулу 2,2 мл (= 2,2 г)): Активные компоненты: Hepar suis D 8 22 мкл, Cyanocobalaminum D 4 22 мкл, Duodenum suis D 10 22 мкл, Thymus suis D 10 22 мкл, Colon suis D 10 22 мкл, Vesica fellea suis D 10 22 мкл, Pankreas suis D 10 22 мкл, Cinchona pubescens D 4 22 мкл, Lycopodium clavatum D 4 22 мкл, Chelidonium majus D 4 22 мкл, Silybum marianum D 3 22 мкл, Histaminum D 10 22 мкл, Sulfur D 13 22 мкл, Avena sativa D 6 22 мкл, Fel tauri D 8 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum D 10 22 мкл, Acidum a-ketoglutaricum D 10 22 мкл, Acidum malicum D 10 22 мкл, Acidum fumaricum D 10 22 мкл, Acidum thiocticum D 8 22 мкл, Acidum oroticum monohydricum D 6 22 мкл, Cholesterolum D 10 22 мкл, Calcium carbonicum Hahnemanni D 28 22 мкл, Taraxacum officinale D 4 22 мкл, Cynara scolymus D 6 22 мкл, Veratrum album D 4 22 мкл, Вспомогательные вещества: вода для инъекций 1628 мг, натрия хлорид для установления изотонии.

Форма выпуска

Раствор

Показания

В комплексной терапии острых и хронических заболеваний печени и желчного пузыря. В комплексной терапии заболеваний кожи воспалительного и невоспалительного характера (токсическая экзантема, дерматоз, дерматит, нейродермит).

Способ применения и дозы

1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно. Курс терапии при острых заболеваниях 3-5 недель, при хронических заболеваниях не менее 4-8 недель. Терапию проводят под наблюдением врача.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

В редких случаях возможны кожные реакции. В таком случае терапию этим препаратом следует прекратить и проконсультироваться у лечащего врача.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. При превышении рекомендованных доз необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Назначение комплексных гомеопатических лекарственных средств не исключает применение при данном заболевании других лекарственных средств.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом врачу.

Условия хранения

В сухом месте