# Инструкция по применению
# Гепатромбин мазь для наружного применения (300 ме+4 мг+3 мг/г) 40 г

## Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Сербия
Производитель: Hemofarm
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аллантоин+Гепарин натрия+Декспантенол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 3000МЕ+ 4 мг+ 3 мг/г
Срок годности: 36




## Описание

Белая однородная мазь с характерным запахом. бесцветный прозрачный гель с характерным запахом.

## Действующее вещество

Аллантоин+Гепарин натрия+Декспантенол

## Состав

100 г мази содержат: Активные вещества Гепарин натрия 50 000 МЕ, аллантоин 0,30 г, декспантенол 0,40 г: Вспомогательные вещества Бронопол, карбомер 934, лунацера М, хостафат KW-340-N, левоментол, парафин жидкий, пурцелинол, тетин 515, динатрия эдетат, триэтаноламин, вазелин белый, вола очищенная. 100 г геля содержат: Активные вещества Гепарин натрии 50 000 МЕ, аллантоин 0,250 г, декспантенол 0,250 г., Вспомогательные вещества Карбомер 940, левоментол, динатрия эдетат, триэтаноламин, масло Pini silvestis (сосны обыкновенной), масло Pini pumilious (кедрового стланика), эфирное масло лимона, сорбитол 70% некристаллизующийся, изопропиловый спирт, софтиген 767, полисорбат 80, вода очищенная.

## Форма выпуска

Мазь

**Показания**

Тромбоз, тромбофлебит, варикозное расширение вен, трофические язвы голени (для мази), спортивные травмы, тендовагинит, воспалительные инфильтраты.

**Способ применения и дозы**

Наружно. На пораженные участки 1-3 раза в сутки наносят столбик мази длиной 5 см, не втирая. При лечении заболевании вен препарат применяют в виде повязок с мазью. При трофических язвах мазь наносится в виде кольца шириной около 4 см. Гель наносят тонким слоем, втирая легкими массирующими движениями снизу вверх (при тромбозах и тромбофлебитах массирование не рекомендуется). При заболеваниях вен нижних конечностей мазь наносят легкими втирающими движениями по направлению снизу вверх, разовую дозу рекомендуется втирать не полностью, а отдельными порциями.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, нарушение целостности кожных покровов (для геля), инфицированные повреждения кожных покровов.

**Побочные действия**

Аллергические реакций (кожная сыпь, гиперемия кожи, крапивница, ангионевротический отек).

**Условия хранения**

Беречь от детей