Инструкция по применению
Гепатромбин С гель для наружного применения 500 МЕ+25 мг+150 мг/г 40 г

Характеристики



Форма выпуска: Гель
Страна: Сербия
Производитель: Hemofarm
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гепарин натрия+Декспантенол+Диметилсульфоксид
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 500 МЕ + 150
Срок годности: 60.0

Действующее вещество

Гепарин натрия+Декспантенол+Диметилсульфоксид

Состав

1 г препарата содержит: Действующие вещества Гепарин натрия - 500 МЕ*, диметилсульфоксид - 150,0 мг, декспантенол - 25,0 мг, Вспомогательные вещества Изопропанол - 353,3 мг, карбомер- 940 - 10,0 мг, макрогола глицерилгидроксистеарат - 10,0 мг, троламин - 5,0 мг, сосны горной масло - 2,5 мг, розмарина масло - 2,0 мг, лимона масло - 0,5 мг, вода очищенная - 438,6 мг. *1 МЕ гепарина натрия - антикоагулянтная активность, соответствующая активности 0,0077 мг II Международного стандарта гепарина (ВОЗ)

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

Фармакокинетика Гепарин натрия при наружном применении быстро проникает в кожу: через 1 час после нанесения геля на кожу концентрация в подлежащих тканях сопоставима с концентрацией, которая наблюдается после внутривенного введения (в /в) 5000 МЕ гепарина. Гепарин не проникает через плацентарный барьер и не выделяется с грудным молоком. Декспантенол - после резорбции в кожу превращается в пантотеновую кислоту (витамин В5), которая, являясь составной частью коэнзима А, участвует в многочисленных процессах обмена веществ. Диметилсульфоксид быстро проникает через кожу, слизистые оболочки, биологические мембраны (в том числе через оболочки микробных клеток). После нанесения на кожу максимальная концентрация в плазме достигается через 4-8 часов. Равномерно распределяется в организме, за исключением головного мозга, где его концентрация минимальна. Выделяется в основном с мочой (30% дозы в виде неизмененного препарата и диметилсульфона), в незначительной степени - через легкие и кишечник. Метаболит диметилсульфид обусловливает характерный чесночный запах изо рта у некоторых пациентов.

Показания

Гематомы, воспаление мягких тканей, мышц, сухожилий, сухожильных влагалищ, связок после ушибов, сдавлений, травм (в том числе спортивных). Плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча (локоть теннисиста), тендинит, тендовагинит, бурсит, деформирующий остеоартроз (при наличии поражения периартикулярных тканей), невралгии.

Способ применения и дозы

Наружно. Гель наносят тонким слоем на пораженные участки кожи или кожу над болезненной зоной, стараясь избегать нанесения препарата непосредственно на раны и ссадины. После нанесения геля не следует накладывать повязку. Перед нанесением кожа должна быть чистой и сухой. Процедуру повторяют 1-2 раза в день в течение 7-10 дней или до исчезновения симптомов заболевания (боль, отек, воспаление). Если в течение 10 дней применения геля не наступает отчетливого улучшения, рекомендуется обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к гепарину, диметилсульфоксиду, декспантенолу и другим компонентам препарата, бронхиальная астма, беременность, период лактации, тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность, выраженные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы (в том числе тяжелая стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт, выраженный общий атеросклероз), красная волчанка, открытые раны в месте нанесения препарата, детский возраст до 5 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Гепатромбин С гель противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Гиперемия, зуд и жжение кожи в области аппликации, аллергические реакции (крапивница, ангионевротический отек), запах чеснока изо рта, изменение вкусовых ощущений.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки препарата Гепатромбин С не описано. При правильном применении геля передозировка маловероятна.

Взаимодействие с другими препаратами

Входящий в состав геля диметилсульфоксид значительно усиливает проникновение других лекарственных средств через кожу. Для предотвращения нежелательных эффектов данных веществ, не следует наносить на кожу другие препараты до или после нанесения Гепатромбина С.

Особые указания

Не рекомендуется наносить гель на открытые раны. При возникновении кожных аллергических реакций следует прекратить лечение.

Условия хранения

Беречь от детей