Инструкция по применению
Гепавит таблетки 100 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Экология Питания
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 100

Описание

Биологически активная добавка, которая является источником очень нужных организму флаволигнанов и флавноидов, благотворно влияющих на печень. Еще древние римляне для лечения отравлений применяли растение расторопша, являющееся основным компонентом БАД «Гепавит». В расторопше обнаружены около 400 биологически активных компонентов, самыми ценными из которых являются 12 видов силимаринов, укрепляющих клеточные мембраны печени. Она признана сильнейшим природным гептопротектором и дезинтоксикатором, так как она нейтрализует токсины и яды, которые должны выводиться из организма печенью, тем самым, давая ей отдых. Об эффективности растропши свидетельствует тот факт, что при ее помощи удается избежать смертельного исхода при отравлении бледной поганкой. В связи с нынешней неблагоприятной экологической ситуацией, постоянно возрастающее загрязнения атмосферы выхлопными газами, которые содержат соединения свинца и других токсических веществ, необходимо систематически проводить защиту печени, принимая БАД «Гепавит» из расторопши пятнистой.

Состав

Активное вещество:плоды расторопши Вспомогателные вещества: сахар-песок, целлюлоза микрокристаллическая, диоксид кремния

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Дискинезия желчевыводящих путей, особенно сочетающаяся с поражением печени — хронические гепатиты — цирроз печени — жировая дистрофия печени — токсические поражения печени (алкогольные и т.д.) — состояние после операции холецистэктомии, — варикозное расширение вен.

Способ применения и дозы

Взрослым по 2 таблетки 2 раза в день во время еды с пищей.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД.

Побочные действия

При приеме БАД Гепавит возможны кратковременные ухудшения самочувствия: тошнота, горечь, головокружение, боли в правом предреберье, высыпания на коже. Эти симптомы исчезают, без дополнительного лечения. В подобных случаях рекомендуется временно уменьшить дозировку.