Инструкция по применению
Гербион Сироп плюща флакон 150 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Словения
Производитель: KPKA
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Экстракт листьев плюща
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 48.0

Описание

Сироп желтовато-коричневого цвета с характерным запахом. Допускается наличие опалесценции.

Действующее вещество

Экстракт листьев плюща

Состав

1 мл сиропа содержит: Активный компонент: Плюща листьев экстракт сухой (5-7,5 : 1)(*) 7,00 мг Вспомогательные вещества: сорбитол жидкий (E420), глицерол (E422), натрия бензоат (E211), лимонной кислоты моногидрат (E330), бальзам ароматический**, вода очищенная *Плюща листьев экстракт сухой (5-7,5 : 1) приготовлен из: Плюща листьев (Hedera helix L., семейства Аралиевые (Araliaceae), folium) и этанола 30 % (экстрагент). **Бальзам ароматический содержит пропиленгликоль (E1520), этанол (E1510), цитронеллы масло, цитраль из Litsea cubeba, лимона масло, кориандра масло.

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

Препарат представляет собой сухой экстракт листьев плюща и содержит комплекс биологически активных веществ (тритерпеновые сапонины), в связи с чем проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды. Детям от 2 до 5 лет По 2,5 мл сиропа (½ дозирующей ложки) 2 раза в день Детям от 6 до 12 лет По 5 мл сиропа (1 дозирующая ложка) 2 раза в день Взрослым и детям старше 12 лет По 5-7,5 мл сиропа (1-1,5 дозирующей ложки) 2 раза в день Дозирование препарата производится с помощью дозирующей пластиковой ложки. В период лечения препаратом Гербион® сироп плюща рекомендуется употреблять достаточное количество жидкости в теплом виде (вода, чай и др.). Длительность лечения – 7 дней. Проведение повторного курса возможно по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции, детский возраст до 2 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с недостаточностью данных по безопасности применения сухого экстракта листьев плюща у беременных женщин и в период кормления грудью, в связи с чем, препарат Гербион® сироп плюща не рекомендуется применять указанной группе пациентов. Противопоказан детям в возрасте до 2 лет.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Очень редко может наблюдаться слабительный эффект, т.к. препарат содержит сорбитол. В сравнительном исследовании эффективности и безопасности препарата Гербион® сироп плюща (препарат Гербион® сироп плюща принимали 63 пациента) были зарегистрированы по 1 случаю: кожная сыпь, кожный зуд и тошнота.

Передозировка

При приёме больших доз (в три раза превышающих рекомендованные суточные дозы) может развиться тошнота, рвота и диарея. Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Нет сообщений о лекарственном взаимодействии препарата Гербион® сироп плюща с другими лекарственными средствами. Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, т.к. это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

Особые указания

Не следует принимать препарат в дозах, превышающих рекомендованные в инструкции. При заболеваниях органов дыхания, сопровождающихся затруднённым дыханием, лихорадкой, длительным кашлем или мокротой с примесью крови, необходимо немедленно обратиться к врачу. При отсутствии эффекта на фоне лечения препаратом и ухудшении состояния необходимо обратиться к врачу. Препарат Гербион® сироп плюща содержит этиловый спирт (0,01 мг/мл) и сорбитол (Е420). В максимальной разовой дозе (2,5 мл) для детей (от 2 до 5 лет) содержится 0,00025 г абсолютного этилового спирта; в максимальной разовой дозе (5 мл) для детей (от 6 до 12 лет) содержится 0,0005 г абсолютного этилового спирта; в максимальной разовой дозе (от 5 мл до 7,5 мл) для взрослых и детей старше 12 лет содержится 0,0005 г - 0,00075 г абсолютного этилового спирта. В максимальной суточной дозе: (5 мл) для детей (от 2 до 5 лет) содержится 0,0005 г абсолютного этилового спирта; (10 мл) для детей (от 6 до 12 лет) содержится 0,0010 г абсолютного этилового спирта; (от 10 до 15 мл) для взрослых и детей старше 12 лет содержится от 0,0010 г до 0,0015 г абсолютного этилового спирта. Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что 5 мл сиропа содержит 2,5 г сорбитола, что соответствует 0,21 углеводных (хлебных) единиц (ХЕ). При отсутствии эффекта на фоне лечения препаратом в течение 7 дней или ухудшении состояния необходимо обратиться к врачу. Применения при хронических заболеваниях: Противопоказан пациентам с дефицитом сахаразы/изомальтазы, непереносимостью фруктозы, синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции. Влияние на управление транспортными средствами: Нет данных о влиянии препарата Гербион® сироп плюща на способность управлять транспортными средствами и работу с техническими устройствами, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом месте