Инструкция по применению
Гэвкамен Мазь банка 25 г

Характеристики



Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гвоздики цветков масло+Камфора+Мяты перечной листьев масло+Эвкалипта прутовидного листьев масло
Количество в упаковке: 1

Действующее вещество

Гвоздики цветков масло+Камфора+Мяты перечной листьев масло+Эвкалипта прутовидного листьев масло

Состав

Активные вещества: Левоментол (L-ментол) -18 г Камфора рацемическая -10 г Эвкалиптовое масло -10 г Вспомогательные вещества: Гвоздичное масло - 1 г Парафин нефтяной твердый, марка П-1 - 30,5 г Вазелин - до 100 г

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания

В качестве "отвлекающего", местнообезболивающего средства при невралгии, миалгии, артралгии, миозите.

Способ применения и дозы

Наружно. Небольшое количество мази следует нанести на болезненную область и втереть в кожу легкими массажными движениями. Процедуру проводить в зависимости от интенсивности болевых ощущений 2-3 раза в день. После двух недель использования препарата следует проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, дерматологические заболевания, нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения препарата, детский возраст до 12 лет. Беременность и лактация: Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно с учетом ожидаемой пользы для матери и потенциального риска для плода/ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, жжение, покалывание, ощущение холода в местах аппликации мази.

Передозировка

Передозировка Гэвкамена при его местном применении в форме мази маловероятна, что связано с низкой системной абсорбцией препарата. Вероятность развития передозировки повышается при случайном или преднамеренном применении мази внутрь. Типичной клинической картины при употреблении Гэвкамена внутрь не развивается. Возможные симптомы: головокружение, изжога, тошнота, рвота, брадикардия и снижение артериального давления, дезориентация, спутанность сознания, мышечная слабость, миоз, судороги. Меры помощи включают промывание желудка (в случае приема мази внутрь), поддерживающую и симптоматическую терапию, направленную на устранение возникших нарушений. Специфического антидота не существует.

Взаимодействие с другими препаратами

В связи с низкой системной абсорбцией мази Гэвкамен риск развития лекарственных взаимодействий невысок. Тем не менее, следует помнить, что входящие в состав препарата терпеновые компоненты являются индукторами микросомальных ферментов печени, метаболизирующих другие лекарственные средства. Поэтому существует вероятность ослабления эффекта других лекарственных средств, применяемых совместно с мазью Гэвкамен. При одновременном применении с нестероидными противовоспалительными препаратами для местного применения Гэвкамен усиливает их эффект и увеличивает глубину проникновения в мягкие ткани в зоне аппликации. Диметилсульфоксид при одновременной аппликации с мазью Гэвкамен усиливает системную абсорбцию входящих в его состав компонентов эфирных масел и увеличивает глубину проникновения в мягкие ткани в зоне аппликаций.

Условия хранения

от 2# до 15#