
Инструкция по применению
Гидрофурил Таблетки шипучие 16 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки шипучие
Страна: Италия
Производитель: Босналек
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 16



Описание

Специализированный пищевой продукт диетического лечебного питания.Не является лекарственным средством.Осмотическая концентрация раствора: 240 мОсм/л (2 таблетки шипучие в 200 мл воды).

Состав

Глюкоза, натрия гидрокарбонат, калия хлорид, натрия хлорид, натрия карбонат. Вспомогательные вещества: Лимонная кислота, ароматизатор лимонный (вкусоароматические добавки, мальтодекстрин, лимонная кислота (регулятор кислотности Е330)), натрия сахаринат (подсластитель Е 954).Содержание активных веществ в 2 таблетках:Глюкоза 3240 мгЦитрат 756 мгНатрий 276 мгКалий 195 мгХлорид 319 мг.

Форма выпуска

Таблетки шипучие

Показания

Для детей с первых дней жизни и взрослых в составе лечебного питания при обезвоживании организма различной степени тяжести, вызванном различными причинами: потеря жидкости и солей, при остром (инфекционная диарея) и хроническом диарейном синдроме потеря жидкости и солей вследствие неинфекционных причин профилактика водно-электролитных нарушений при повышенной температуре тела профилактика водно-электролитных нарушений при потере жидкостей и солей, связанной с занятиями спортом и/или физической нагрузкой.

Способ применения и дозы

Растворить 2 таблетки шипучие в 200 мл питьевой воды. Принимать полученный раствор после полного растворения таблеток шипучих медленно, глотками. Не следует нагревать раствор после приготовления. Необходимое количество регидратационного раствора следует определить с врачом с учетом степени обезвоживания.Выпаивание ребенка регидратационным раствором следует проводить дробно, небольшими порциями по 5–10 мл на прием каждые 2–3 мин. Для дозирования можно использовать чайную ложку или мерный шприц. В случае возникновения рвоты следует повторить прием той же дозы регидратационного раствора через 15–20 мин.Согласно рекомендациям ВОЗ/ЮНИСЕФ, оральную регидратационную терапию (выпаивание) следует начинать при первых признаках диареи/рвоты, для предотвращения обезвоживания. Признаками обезвоживания являются вялость, учащенное сердцебиение, снижение тургора кожи, выраженная сухость слизистых оболочек (сухой язык с белым или сероватым налетом, сухость и покраснение глаз), «запавший» родничок у младенца, долгое отсутствие мочеиспускания и др.Важно продолжать восполнять потерю жидкости и электролитов до прекращения диареи/рвоты.Матерям рекомендуется продолжать грудное вскармливание и/или кормление молочной смесью. После того, как будет устранено сильное обезвоживание и восстановится аппетит, можно возобновить прием пищи – это ускоряет восстановление нормальной работы кишечника, сводит к минимуму потерю веса. Кормить ребенка следует небольшими порциями, но часто (предлагая ребенку еду каждые три-четыре часа). В период проведения регидратационной терапии рекомендуется избегать приема пищи, богатой жирами и простыми углеводами (это может усугубить диарею). На вторые сутки, в зависимости от возраста ребенка, разрешается съесть нежирный бульон, жидкую кашу, подсушенный хлеб, творог с низким процентом жирности, отварную рыбу.Режим выпаивания и разовый объем регидратационного раствора «Гидрофурил» в первые 4–6 часов обезвоживания:Масса тела до 6 кг: 4–8 приемов по 50 млМасса тела 6 – 8 кг: 8–12 приемов по 50 млМасса тела 8 – 11 кг: 6–8 приемов по 100 млМасса тела 11 – 16 кг: 4–8 приемов по 150 млМасса тела 16 – 30 кг: 6–11 приемов по 200 млМасса тела свыше 30 кг и взрослые: 6–10 приемов по 400 мл.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.