Инструкция по применению
Гимекромон Таблетки 200 мг 50 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Интерфарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гимекромон
Количество в упаковке: 1

Описание

Круглые, плоскоцилиндрические таблетки от почти белого до белого цвета с фаской по краям с двух сторон и риской с одной стороны.

Действующее вещество

Гимекромон

Состав

Действующее вещество: гимекромон - 200 мг: Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный - 45,00 мг, желатин - 3,00 мг, натрия лаурилсульфат - 1,00 мг, магния стеарат - 1,00 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При приеме внутрь легко всасывается из пищеварительного тракта, слабо связывается с белками плазмы. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 2-3 часа. Период полувыведения составляет около 1 часа. Гимекромон выводиться почками (около 93% в виде глюкуроната, 1,4% - сульфоната, 0,3% - в неизмененном виде).

Показания

Дискинезия желчевыводящих путей и сфинктера Оддди по гиперкинетическому типу, некалькулезный хронический холецистит, холангит, холелитиаз, состояние после оперативных вмешательств на желчном пузыре и желчных путях. Снижение аппетита, тошноты, запоры, рвота (на фоне гипосекреции желчи).

Способ применения и дозы

Внутрь, за 30 минут до еды. Взрослым по 200-400 мг (1-2 таблетки) три раза в день. Суточная доза 1200 мг. Детям с 7 лет по 200 мг (1 таблетка) один-три раза в день. Суточная доза 600 мг. Курс лечения 2 недели. В случае пропуска приема дозы следует принять препарат как можно быстрее или, если приближается время следующего приема, пропущенную дозу не принимать. Не следует принимать двойную дозы сразу. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Гиперчувствительность. Непроходимость желчевыводящих путей, почечная /печеночная недостаточность, язвенный колит, болезнь Крона, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, гемофилия. Детский возраст до 7 лет.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, диарея, метеоризм, абдоминальная боль, изъязвление слизистой оболочки ЖКТ, головная боль. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Морфин ослабляет действие гимекромона. При совместном приеме с метоклопрамидом происходит ослабление действия обоих препаратов. Усиливает эффекты непрямых коагулянтов.

Особые указания

Не ухудшает секреторную функцию пищеварительных желез и процессов кишечной абсорбции.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.