Инструкция по применению
Гимекромон Таблетки 200 мг 50 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармпроект
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гимекромон
Количество в упаковке: 50

Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого или почти белого цвета, с фаской.

Действующее вещество

Гимекромон

Состав

Препарат Гимекромон содержит: Действующим веществом является гимекромон. Каждая таблетка содержит 200 мг гимекромона. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: крахмал картофельный, повидон К 30, натрия лаурилсульфат, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат Гимекромон применяется у взрослых и детей в возрасте от 7 лет по следующим показаниям: дискинезия желчевыводящих путей и сфинктера Одди по гиперкинетическому типу, некалькулезный хронический холецистит, холангит, желчекаменная болезнь, состояние после оперативных вмешательств на желчном пузыре и желчных путях, снижение аппетита, тошнота, запоры, рвота (на фоне гипосекреции желчи).

Способ применения и дозы

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки, медицинской сестры. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом, работником аптеки или медицинской сестрой. Рекомендуемая доза Взрослые По 200–400 мг (1–2 таблетки) 3 раза в сутки. Суточная доза 1200 мг. Применение у детей и подростков Детям с 7 лет по 200 мг (1 таблетка) 1–3 раза в сутки. Суточная доза 600 мг. Путь и (или) способ введения Внутрь, за 30 мин до еды. Продолжительность терапии Курс лечения 2–3 недели.

Противопоказания

Не принимайте и не давайте Вашему ребенку препарат Гимекромон: если у Вас или у Вашего ребенка аллергия на гимекромон или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша), если у Вас или у Вашего ребенка непроходимость желчевыводящих путей, если у Вас или у Вашего ребенка почечная и /или печеночная недостаточность, если у Вас или у Вашего ребенка язвенный колит и болезнь Крона, если у Вас или у Вашего ребенка язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гемофилия, если Вашему ребенку менее 7 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Нет данных о безопасности применения гимекромона при беременности и в период грудного вскармливания. Назначение препарата Гимекромон беременным женщинам и в период грудного вскармливания допустимо только в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Гимекромон может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Прекратите прием препарата Гимекромон и немедленно обратитесь за медицинской помощью, в случае возникновения одного из следующих признаков аллергической реакции: затрудненное дыхание или глотание, головокружение, отек лица, губ, языка или горла, сильный зуд кожи, появление сыпи или волдырей. Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Гимекромон Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно): диарея (понос), метеоризм (повышенное газообразование, сопровождающееся вздутием живота, чувством распирания и болью), абдоминальная боль (боль в животе), изъязвление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, головная боль. Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом, работником аптеки или медицинской сестрой. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листкевкладыше. Вы так же можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы забыли принять препарат Гимекромон Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. В случае пропуска приема дозы примите препарат как можно быстрее, если приближается время следующего приема, то не принимайте пропущенную дозу. Если после лечения улучшение не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Морфин ослабляет действие гимекромона. При совместном приеме гимекромона и метоклопрамида происходит снижение действия обоих препаратов. Гимекромон усиливает действие непрямых антикоагулянтов.

Особые указания

Перед приемом препарата Гимекромон проконсультируйтесь с лечащим врачом, работником аптеки или медицинской сестрой. В случае появления симптомов печеночной и/или почечной недостаточности необходимо прекратить прием препарата. Дети Не давайте препарат детям в возрасте младше 7 лет. Препарат Гимекромон содержит натрий Данный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на 1 таблетку, то есть, по сути, не содержит натрия. Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Храните препарат при температуре ниже 25 °С.