Инструкция по применению
Гимекромон-СЗ Таблетки 200 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Северная Звезда
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гимекромон
Количество в упаковке: 50



Описание

Таблетки белого или почти белого цвета, круглые, плоскоцилиндрические с фаской и риской с одной стороны.

Действующее вещество

Гимекромон

Состав

Состав на одну таблетку действующее вещество: гимекромон 200 мг вспомогательные вещества: крахмал картофельный 45,0 мг, желатин 3,0 мг, натрия лаурилсульфат 1,0 мг, магния стеарат 1,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При приеме внутрь легко всасывается из пищеварительного тракта, слабо связывается с белками плазмы. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 23 часа. Период полувыведения составляет около 1 часа. Гимекромон выводится почками (около 93 % в виде глюкуроната, 1,4 % сульфоната, 0,3 % в неизмененном виде).

Показания

Дискинезия желчевыводящих путей и сфинктера Одди по гиперкинетическому типу, некалькулезный хронический холецистит, холангит, холелитиаз, состояние после оперативных вмешательств на желчном пузыре и желчных путях. Снижение аппетита, тошнота, запоры, рвота (на фоне гипосекреции желчи).

Способ применения и дозы

Внутрь, за 30 минут до еды взрослым по 200400 мг (12 таблетки) три раза в день. Суточная доза 1200 мг. Детям с 7 лет по 200 мг (1 таблетка) один три раза в день. Суточная доза 600 мг. Курс лечения 2 недели. В случае пропуска приема дозы следует принять препарат как можно быстрее или, если приближается время следующего приема, пропущенную дозу не принимать. Не следует принимать двойную дозу сразу. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Гиперчувствительность. Непроходимость желчевыводящих путей, почечная /печеночная недостаточность, язвенный колит, болезнь Крона, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гемофилия. Детский возраст до 7 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Нет данных о безопасности применения гимекромона при беременности и в период грудного вскармливания. Применение препарата ГимекромонСЗ при беременности и в период грудного вскармливания допустимо по назначению врача только в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции диарея, метеоризм, абдоминальная боль, изъязвление слизистой оболочки ЖКТ, головная боль. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Морфин ослабляет действие гимекромона. При совместном приеме с метоклопрамидом происходит ослабление действия обоих препаратов Усиливает эффекты непрямых антикоагулянтов.

Особые указания

Не ухудшает секреторную функцию пищеварительных желез и процессов кишечной абсорбции. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Препарат ГимекромонСЗ не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.