Инструкция по применению
Гиналгин таблетки вагинальные N10

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Польша
Производитель: Меда Фарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Метронидазол
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 250 мг+100 мг



Действующее вещество

Метронидазол

Состав

1 таб. метронидазол 250 мг хлорхинальдол 100 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, тальк, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат. Состав оболочки капсулы: желатин, метилпарагидроксибензоат (Е218), пропилпарагидроксибензоат (Е216), бриллиантовый черный краситель (Е151), оксид железа черный (Е172), титана диоксид (Е171), оранжевый краситель (Е110), хинолиновый желтый (Е 104).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Лечение — бактериальный вагинит . — трихомонадный вагинит . — грибковый вагинит . — вагинит, вызванный смешанной флорой. Профилактика — перед хирургическим лечением гинекологических заболеваний . — перед родами и абортами . — до и после введения внутриматочных контрацептивных средств . — до и после коагуляции шейки матки . — перед гистерографией.

Способ применения и дозы

1 вагинальная таблетка в сутки, в течение 7-10 дней. Лечение начинают на 2-4 день после менструации. Таблетку следует ввести глубоко во влагалище, предпочтительно вечером перед сном. При необходимости возможно проведение повторного курса лечения.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к компонентам препарата — заболевания крови — нарушение координации движений, органические поражения ЦНС (в т.ч. эпилепсия) — печеночная недостаточность (в случае назначения больших доз), — беременность — период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Местные реакции: зуд, жжение, боль и раздражение во влагалище . густые, белые, слизистые выделения из влагалища без запаха или со слабым запахом, учащенное мочеиспускание . после отмены препарата - развитие кандидоза влагалища. Ощущение жжения или раздражение полового члена у полового партнера . Со стороны ЖКТ: тошнота, изменение вкусовых ощущений, металлический привкус во рту, сухость во рту, снижение аппетита, спастические боли в брюшной полости, тошнота, рвота, запор или диарея . Аллергические реакции: крапивница, зуд кожных покровов, сыпь . Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение. Прочие: лейкопения или лейкоцитоз . окрашивание мочи в красно-коричневый цвет, вследствие присутствия водорастворимого пигмента, образующегося в результате метаболизма метронидазола. В случае возникновения любых нежелательных побочных эффектов необходимо прекратить лечение и обратиться к врачу.

Особые указания

Местные реакции: зуд, жжение, боль и раздражение во влагалище . густые, белые, слизистые выделения из влагалища без запаха или со слабым запахом, учащенное мочеиспускание . после отмены препарата - развитие кандидоза влагалища. Ощущение жжения или раздражение полового члена у полового партнера . Со стороны ЖКТ: тошнота, изменение вкусовых ощущений, металлический привкус во рту, сухость во рту, снижение аппетита, спастические боли в брюшной полости, тошнота, рвота, запор или диарея . Аллергические реакции: крапивница, зуд кожных покровов, сыпь . Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение. Прочие: лейкопения или лейкоцитоз . окрашивание мочи в красно-коричневый цвет, вследствие присутствия водорастворимого пигмента, образующегося в результате метаболизма метронидазола. В случае возникновения любых нежелательных побочных эффектов необходимо прекратить лечение и обратиться к врачу.