Инструкция по применению
Гинкго Билоба Капсулы 40 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Вертекс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гинкго двулопастного листьев экстракт
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 40 мг



Описание

Твердые желатиновые капсулы № 3 дозировка 40 мг желтого цвета. Содержимое капсул - порошок или уплотненная масса желтовато-коричневого цвета с частицами коричневого и белого цвета, распадающаяся при нажатии.

Действующее вещество

Гинкго двулопастного листьев экстракт

Состав

1 капсула содержит: Дозировка 40 мг Активное вещество: гинкго двулопастного листьев экстракт сухой с содержанием не менее 24% флавоноидных гликозидов и не менее 6% терпеновых лактонов - 40,0 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 95,0 мг, кроскармеллоза натрия - 7,5 мг, кремния диоксид коллоидный - 3,0 мг, тальк - 3,0 мг, магния стеарат - 1,5 мг. Капсулы твердые желатиновые: титана диоксид - 2,0%, железа оксид желтый (железа оксид) - 0,6286%, желатин - до 100%.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

После приема внутрь экстракта гинкго терпенлактоны (гинкголид А гинкголид В и билобалид) обладают высокой биодоступностью которая составляет 100% (98%) для гинкголида А 93% (79%) для гинкголида В и 72% для билобалида. После приема 80 мг экстракта максимальные концентрации в плазме крови составляют: 15 нг/мл для гинкголида А 4 нг/мл для гинкголида В и приблизительно 12 нг/мл для билобалида. Период полувыведения - 39 часа (гинкголид А) 7 часов (гинкголид В) и 32 часа (билобалид). Связывание с белками плазмы крови составляет: 43% для гинкголида А 47% для гинкголида В и 67% для билобалида.

Показания

Дисциркуляторная энцефалопатия различной этиологии (развивающаяся вследствие инсульта черепно-мозговой травмы в пожилом возрасте) сопровождающаяся: снижением внимания ослаблением памяти снижением интеллектуальных способностей нарушением сна, нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции (в т. ч. артериопатия нижних конечностей) синдром Рейно, нейросенсорные нарушения (головокружение шум в ушах гипоакузия) старческая дегенерация желтого пятна диабетическая ретинопатия.

Способ применения и дозы

Внутрь запивая небольшим количеством воды независимо от приема пищи. Продолжительность курса лечения - не менее 3 месяцев (особенно для пациентов пожилого возраста). Проведение повторного курса лечения возможно по рекомендации врача. Если врачом не назначен другой режим дозирования следует придерживаться следующих рекомендаций по приему препарата: Дисциркуляторная энцефалопатия различной этиологии: Дозировка 40 мг По 1-2 капсуле 3 раза в день. Дозировка 80 мг По 1 капсуле 2 раза в день. Нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции (в т. ч. артериопатия нижних конечностей) синдром Рейно: Дозировка 40 мг По 1 капсуле 3 раза в день или по 2 капсулы 2 раза в день. Дозировка 80 мг По 1 капсуле 2 раза в день. Нейросенсорные нарушения (головокружения шум в ушах гипоакузия) старческая дегенерация желтого пятна диабетическая ретинопатия: Дозировка 40 мг По 1 капсуле 3 раза в день или по 2 капсулы 2 раза в день. Дозировка 80 мг По 1 капсуле 2 раза в день. Если был пропущен прием препарата или было принято недостаточное его количество последующий его прием следует проводить так как это указано в данной инструкции без каких-либо изменений.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, пониженная свертываемость крови, острые нарушения мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, эрозивный гастрит, артериальная гипотензия, беременность период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, дефицит сахаразы изомальтазы непереносимость фруктозы глюкозо- галактозная мальабсорбция.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (покраснение отечность кожи зуд) нарушения функции желудочно-кишечного тракта (тошнота рвота диарея) головная боль нарушения слуха бессонница головокружение снижение свертываемости крови. В случае возникновения каких-либо нежелательных явлений прием препарата следует прекратить и обратиться к лечащему врачу.

Передозировка

Случаи передозировки препарата до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется применение препарата пациентам постоянно принимающим ацетилсалициловую кислоту антикоагулянты (прямого и непрямого действия) а также препараты понижающие свертываемость крови. Возможны единичные случаи кровотечения у пациентов одновременно принимающих средства снижающие свертываемость крови, причинная связь данных кровотечений с приемом препаратов Гинкго двулопастного не подтверждена. При применении с гипотензивными средствами возможно потенцирование антигипертензивного эффекта.

Особые указания

Улучшение состояния проявляется через 1 месяц после начала лечения. При часто возникающих ощущениях головокружения и шума в ушах необходимо проконсультироваться с врачом. В случае внезапного ухудшения или потери слуха незамедлительно обратиться к врачу. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Учитывая возможность развития побочных эффектов со стороны центральной нервной системы при приеме препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т. ч. управление транспортными средствами работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.