Инструкция по применению
Гинкго Билоба-Тева Капсулы 80 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: ТЕВА
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 80 мг



Описание

Гинкго Билоба-Тева, 80 мг, капсулыТвёрдые желатиновые капсулы № 0 жёлтого цвета. Содержимое капсул - порошок или уплотнённая масса желтовато-коричневого цвета с частицами коричневого и белого цвета, распадающаяся при нажатии.

Состав

Препарат Гинкго Билоба-Тева содержит Действующим веществом является Гинкго двулопастного листьев экстракт. Каждая капсула содержит 80 мг Гинкго двулопастного листьев (Ginkgo bilobae foliorum) экстракта сухого с содержанием не менее 22 % флавоноидных гликозидов и не менее 5,4 % терпеновых лактонов. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: лактозы моногидрат (см. раздел 2 листка-вкладыша), кроскармеллоза натрия (см. раздел 2 листка-вкладыша), кремния диоксид коллоидный, тальк, магния стеарат. Капсулы твёрдые желатиновые содержат: титана диоксид Е 171, краситель железа (III) оксид жёлтый (железа оксид) Е 172, желатин.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Препарат Гинкго Билоба-Тева применяется у взрослых в возрасте от 18 лет: * при симптоматическом лечении когнитивных нарушений (ухудшение памяти, снижение концентрации внимания и интеллектуальных способностей), * в составе комплексной терапии головокружения вестибулярного происхождения в качестве вспомогательного лечения в дополнение к вестибулярной реабилитации, * при симптоматическом лечении тиннитуса (звон или шум в ушах).

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом. Рекомендуемая доза Симптоматическое лечение когнитивных нарушений По 1–2 капсуле 40 мг 3 раза в день или по 1 капсуле 80 мг 1–3 раза в день. Комплексная терапия головокружения вестибулярного происхождения в качестве вспомогательного лечения в дополнение к вестибулярной реабилитации и симптоматическое лечение тиннитуса По 1 капсуле 40 мг 3 раза в день или по 1 капсуле 80 мг 2 раза в день. Путь и (или) способ введения Препарат Гинкго Билоба-Тева принимать внутрь. Капсулы следует проглатывать целиком, запивая небольшим количеством воды, независимо от приёма пищи. Продолжительность терапии Курс лечения составляет не менее 3 месяцев. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Противопоказания

Не принимайте препарат Гинкго Билоба-Тева, если: * у Вас аллергия на Гинкго двулопастного экстракт или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша), * у Вас пониженная свёртываемость крови, * у Вас эрозивный гастрит в стадии обострения, * у Вас язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, * у Вас острые нарушения мозгового кровообращения, * у Вас острый инфаркт миокарда, * Вы беременны или кормите грудью.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Не принимайте препарат Гинкго Билоба-Тева, если Вы беременны. Не рекомендуется принимать препарат во время грудного вскармливания.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Гинкго Билоба-Тева может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Прекратите приём препарата Гинкго Билоба-Тева и немедленно обратитесь за медицинской помощью, в случае возникновения одного из следующих признаков тяжёлой аллергической реакции (отёка Квинке или ангионевротического отёка), которая наблюдалась редко (может возникать не более чем у 1 человека из 1000): * затруднённое глотание или дыхание, * головокружение, * отёк губ, лица, горла или языка, * сильный зуд кожи, появление сыпи или волдырей. Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приёме препарата Гинкго Билоба-Тева: Часто (могут возникать не более чем у одного человека из 10): * аллергическая реакция (гиперчувствительность), * одышка (диспноэ), * головокружение, * головная боль, * обморок, * тошнота, * боль в животе, * жидкий стул (диарея), * нарушение пищеварения, болезненные ощущения и дискомфорт в верхней части живота (диспепсия), * экзема, * зуд. Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): * крапивница, * сыпь.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Гинкго Билоба-Тева больше, чем следовало Значительного опыта передозировки препаратом нет. В случае развития передозировки лечение симптоматическое. Если Вы чувствуете возникновение какой-либо нежелательной реакции, обратитесь к лечащему врачу. Если Вы забыли принять препарат Гинкго Билоба-Тева Вы должны использовать препарат с частотой, назначенной Вам лечащим врачом, или как указано в листке-вкладыше, так как регулярность приёма делает лечение более эффективным. Тем не менее, если Вы забыли принять лекарственный препарат, используйте следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропущенную. При наличии вопросов по применению лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Это связано с тем, что препарат Гинкго Билоба-Тева может повлиять на действие других препаратов или наоборот, может увеличить риск и степень серьёзности нежелательных реакций. Обязательно поставьте в известность лечащего врача, если Вы принимаете: * ацетилсалициловую кислоту, * тиазидные диуретики, * трициклические антидепрессанты, * противосудорожные препараты, * некоторые антибиотики (гентамицин), * препараты, снижающие свёртываемость крови, * некоторые бета-адреноблокаторы (талинолол), * некоторые противовирусные препараты (эфавиренз). Препарат Гинкго Билоба-Тева с алкоголем Во время лечения препаратом Гинкго Билоба-Тева не употребляйте алкоголь.

Особые указания

Сообщите врачу о том, что Вы принимаете препарат Гинкго Билоба-Тева, если у Вас запланировано хирургическое вмешательство. Прекратите приём препарата за 3–4 дня до любой операции, так как существует риск кровотечения, если Вы продолжите принимать препарат. Следует соблюдать осторожность при одновременном применении препарата с эфавирензом. Не следует превышать рекомендованные дозы препарата Гинкго Билоба-Тева. Возможен длительный приём курсами. При развитии реакции повышенной чувствительности (аллергической реакции) прекратите прием препарата и обратитесь к врачу. При часто возникающих ощущениях головокружения и шума в ушах проконсультируйтесь с врачом. В случае внезапного ухудшения или потери слуха, следует незамедлительно обратиться к врачу. Не рекомендуется принимать препарат вместе с этанолом (алкоголем). Дети и подростки Препарат Гинкго Билоба-Тева противопоказан к применению детям и подросткам в возрасте до 18 лет, в связи с тем, что данные по безопасности и эффективности препарата Гинкго Билоба-Тева у детей и подростков отсутствуют. Препарат Гинкго Билоба-Тева содержит натрий Лекарственный препарат Гинкго Билоба-Тева содержит натрий. Данную информацию необходимо учитывать пациентам, находящимся на диете с ограниченным поступлением натрия. Препарат Гинкго Билоба-Тева содержит лактозы моногидрат Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приёмом лекарственного препарата Гинкго Билоба-Тева. Содержание лактозы в 1 капсуле 40 мг препарата соответствует 0,008 ХЕ (хлебным единицам). Содержание лактозы в 1 капсуле 80 мг препарата соответствует 0,016 ХЕ (хлебным единицам). Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: В период приёма препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами), а при развитии нежелательных реакций, в том числе, головокружения, необходимо воздержаться от управления транспортными средствами.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребёнка месте так, чтобы ребёнок не мог увидеть его. Храните препарат при температуре не выше 25 °C.