Инструкция по применению
Гинкго таблетки 40 мг 40 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 40

Описание

Таблетки круглые, двояковыпуклой формы, покрытые пленочной оболочкой, белого цвета.

Состав

На одну таблетку: Активный компонент Гинкго двулопастного листьев экстракт (Гинкго двулопастного экстракт сухой*) с содержанием суммы гинкгофлавонгликозидов в пересчете на рутин и сухое вещество 24,0% - 40 мг Вспомогательные вещества ядра Лактозы моногидрат - 115,0 мг Целлюлоза микрокристаллическая - 60,0 мг Крахмал кукурузный - 25,0 мг Кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 2,5 мг Магния стеарат - 2,5 мг Кроскармеллоза натрия - 5,0 мг Вспомогательные вещества оболочки Гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) - 8,0 мг Титана диоксид - 5,5 мг Макрогол 6000 (полиэтиленгликоль 6000) - 2,5 мг

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Всасывание После пероральногд введения биодоступность терпенлактонов (гинкголид А гинкголид В и билобалид) после приема внутрь составляет: 80% для гинкголида А 88% для гинкголида В и 79% для билобалида. Распределение Пик плазменной концентрации составлял 16-22 нг/мл для гинкголида А 8-10 нг/мл для гинкголида В и 27-54 нг/мл для билобалида после введения в форме таблеток. Связывание с белками плазмы крови составляет: 43% для гинкголида А 47% для гинкголида В и 67% для билобалида. Выведение Период полувыведения - 39 часа (гинкголид А) 4-6 часов (гинкголид В) и 2-3 часа (билобалид).

Показания

Симптоматическое лечение когнитивных нарушений у взрослых. В составе комплексной терапии головокружения вестибулярного происхождения в качестве вспомогательного лечения в дополнение к вестибулярной реабилитации. Симптоматическое лечение тиннитуса (звон или шум в ушах).

Способ применения и дозы

При симптоматическом лечении когнитивных нарушений у взрослых при головокружении вестибулярного происхождения в качестве вспомогательного лечения в дополнение к вестибулярной реабилитации симптоматическом лечении тиннитуса (звон или шум в ушах) по 1 таблетке 3 раза в день. Таблетки необходимо запивать 1/2 стакана воды и принимать во время еды. Курс лечения составляет не менее 3 месяцев. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача. Если прием препарата был пропущен или было принято недостаточное его количество то последующий прием препарата следует проводить так как это указано в данной инструкции без каких-либо изменений.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата пониженная свертываемость крови эрозивный гастрит в стадии обострения язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения острые нарушения мозгового кровообращения острый инфаркт миокарда беременность период грудного вскармливания дефицит лактазы непереносимость лактозы глюкозо-галактозная мальабсорбция возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Классификация побочных реакций (ВОЗ) представлена со следующей частотой: часто (⩾1/100 до <1/10) нечасто (⩾1/1000 до <1/100) редко (⩾1/10000 до <1/1000) очень редко (<1/10000). Нарушения со стороны иммунной системы: Часто: гиперчувствительность диспноэ. Нечасто: крапивница. Редко: отек Квинке. Нарушения со стороны нервной системы: Часто: головокружение головная боль обморок. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: Часто: тошнота боль в животе диарея диспепсия. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: Часто: экзема зуд. Нечасто: сыпь. Если у Вас отмечаются эффекты указанные в инструкции или они усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции сообщите об этом врачу.

Передозировка

В случае развития передозировки лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется применение препарата пациентам постоянно принимающим ацетилсалициловую кислоту антикоагулянты (прямого и непрямого действия) а также тиазидные диуретики трициклические антидепрессанты противосудорожные препараты гентамицин. Возможны единичные случаи кровотечения у пациентов одновременно принимающих лекарственные средства снижающие свертываемость крови, причинно-следственная связь данных кровотечений с приемом препаратов гинкго двулопастного не подтверждена. При применении с гипотензивными средствами возможно потенцирование антигипертензивного эффекта. Не рекомендуется одновременное применение препаратов гинкго двулопастного с эфавирензом так как возможно снижение его концентрации в плазме крови вследствие индукции цитохрома CYP3A4 под влиянием экстракта гинкго двулопастного. Исследование взаимодействия с талинололом показывает что экстракт гинкго двулопастного может ингибировать кишечные Р-гликопротеины что может увеличить воздействие чувствительных к Р-гликопротеину лекарств в кишечнике таких как дабигатран в связи с чем при их одновременном применении необходимо соблюдать осторожность.

Особые указания

Не следует превышать рекомендованные дозы препарата. При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить. Перед хирургическим вмешательством необходимо сообщить врачу о применении препарата. При часто возникающих ощущениях головокружения и шума в ушах необходимо проконсультироваться с врачом. В случае внезапного ухудшения или потери слуха следует незамедлительно обратиться к врачу. Пациентам с кровоточивостью (геморрагическим диатезом) и пациентам получающим антикоагулянтную терапию необходимо проконсультироваться с врачом перед началом терапии препаратом. Не рекомендуется принимать препарат вместе с этанолом. Рекомендуется соблюдать осторожность при совместном приеме препаратов метаболизируемых при помощи цитохрома Р450 - 3А4 (см. раздел "Взаимодействие с другими лекарственными средствами"). На фоне применения препарата у пациентов страдающих эпилепсией возможно появление эпилептических припадков. Препарат содержит лактозу. Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать что в одной таблетке содержится около 014 г углеводов (0012 ХЕ).

Срок хранения после открытия

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.