Инструкция по применению
Гинокапс капсулы вагинальные 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Беларусь
Производитель: Иннолек
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Метронидазол+Миконазол
Количество в упаковке: 10

Описание

Препарат с антибактериальным, противопротозойным и противогрибковым действием для местного применения в гинекологии

Действующее вещество

Метронидазол+Миконазол

Состав

p3-lechenie-infekcij-molochnica

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

При интравагинальном применении метронидазол абсорбируется в системный кровоток. Cmax метронидазола в крови определяется через 6-12 ч и составляет примерно 50% от той Cmax, которая достигается (через 1-3 ч) после однократного приема эквивалентной дозы метронидазола внутрь. Метронидазол проникает в грудное молоко и большинство тканей, проникает через ГЭБ и плацентарный барьер. Связывание с белками плазмы - менее 20%. Метаболизируется в печени путем гидроксилирования, окисления и глюкуронирования. Активность основного метаболита (2-оксиметронидазола) составляет 30% активности исходного соединения. Выводится почками - 60-80% дозы препарата системного действия (20% этого количества в неизмененном виде). Метаболит метронидазола, 2-оксиметронидазол, окрашивает мочу в красно-коричневый цвет, вследствие присутствия водорастворимого пигмента, образующегося в результате метаболизма метронидазола. Кишечником выводится - 6-15% дозы препарата системного действия.

Показания

Для местного лечения вагинитов смешанной этиологии, вызванных одновременно Trichomonas spp. и Candida spp.

Способ применения и дозы

Применяют интравагинально по 1 разовой дозе ежедневно в течение 10 дней. Можно применять в сочетании с метронидазолом для приема внутрь.

Противопоказания

Лейкопения (в т.ч. в анамнезе), органические поражения ЦНС (в т.ч. эпилепсия), печеночная недостаточность, I триместр беременности, период лактации (грудного вскармливания), детский возраст до 18 лет, повышенная чувствительность к компонентам препарата и к другим азолам.

Применение при беременности и кормлении грудью

метронидазол 100 мг, миконазола нитрат 100 мг Вспомогательные вещества: лецитин очищенный - 45 мг, воск пчелиный - 144 мг, вода очищенная - 108 мг, масло подсолнечное - достаточное количество до получения содержимого капсулы массой 1800 мг. Состав оболочки желатиновой капсулы: желатин - 268 мг, глицерол - 134 мг, вода очищенная - 35 мг, метилпарагидроксибензоат Е-218 - 0.5 мг, пропилпарагидроксибензоат Е-216 - 0.13 мг, титана диоксид Е-171 - 1.8 мг, краситель: "солнечный закат" желтый Е-110 - 0.026 мг.

Передозировка

В период применения данной комбинации употребление алкоголя строго запрещено (опасность развития дисульфирамоподобных реакций).В период применения препарата рекомендуется воздерживаться от половых контактов. Рекомендуется одновременное лечение половых партнеров.На фоне лечения возможна незначительная лейкопения, поэтому целесообразно контролировать картину крови (количество лейкоцитов) в начале и в конце терапии.Метронидазол может иммобилизировать трепонемы, что приводит к ложноположительному TPI тесту (тесту Нельсона).Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмамиПри появлении побочных эффектов со стороны ЦНС следует воздержаться от управления автотранспортом и работы с потенциально опасными механизмами.

Взаимодействие с другими препаратами

Местные реакции: зуд, жжение, боль, раздражение слизистой оболочки влагалища, густые, белые, слизистые выделения из влагалища без запаха или со слабым запахом, ощущение жжения или раздражение полового члена у партнера.Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, изменение вкусовых ощущений, металлический привкус во рту, снижение аппетита, абдоминальная боль спастического характере, диарея, запор.Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение.Со стороны системы кроветворения: лейкопения или лейкоцитоз. Аллергические реакции: крапивница, зуд кожных покровов, сыпь.

Особые указания

Применение в I триместре беременности противопоказано. Применение препарата во II и III триместрах возможно только в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превосходит риск для плода. Метронидазол выделяется с грудным молоком. В период грудного вскармливания применение противопоказано. При необходимости применения в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

Условия хранения

Беречь от детей, При комнатной температуре