Инструкция по применению
Гино-певарил суппозитории вагинальные 150 мг 3 шт

Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Португалия
Производитель: Johnson & Johnson
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Эконазол
Количество в упаковке: 3
Дозировка действующего вещества: 150 мг
Срок годности: 24.0



Действующее вещество

Эконазол

Состав

Действующее вещество: ЭконазолКонцентрация действующего вещества (мг): 150 мг

Форма выпуска

Суппозитории

Фармакокинетика

При нанесении на кожу системная абсорбция минимальна и практически незначима. Терапевтические концентрации создаются в эпидермисе (в т.ч. в роговом слое), а также в дерме. Менее 1% применяемой дозы выводится с каловыми массами и почками.

Показания

Гино-Певарил показан для лечения вульвовагинальных микозов.

Способ применения и дозы

Интравагинально. Суппозитории по 50 мг Вагинальный суппозиторий вводят глубоко во влагалище, в положении лежа, непосредственно перед сном в течение не менее 14 дней. Необходимо провести полный курс лечения, несмотря на исчезновение субъективных симптомов (зуд, бели). Суппозитории по 150 мг Вагинальный суппозиторий вводят глубоко во влагалище, в положении лежа, непосредственно перед сном в течение 3-х дней. В случае рецидива или положительного результата культурального исследования через 1 неделю после проведенного лечения проводят второй курс лечения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.Детский возраст до 16 лет.С осторожностью Данные о применении Гино-Певарила у пожилых лиц (старше 65 лет) недостаточны.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. В период лактации применяют с осторожностью.

Побочные действия

При применении Гино-Певарила может наблюдаться местное раздражение, чувство жжения, зуд, эритема, сыпь. Известны отдельные случаи возникновения аллергических реакций, таких как ангионевротический отек и крапивница. Побочные действия препарата систематизированы по органам и частоте появления с использованием следующей классификации: очень часто (больше1/10), часто (больше1 /100, меньше1/10), нечасто (больше1/1000, меньше1/100), редко (больше1/10000, меньше1/1000), очень редко (меньше1/10000), включая единичные случаи. Со стороны иммунной системы: Очень редко: гиперчувствительность. Со стороны кожи и подкожных тканей: Очень редко: ангионевротический отек, крапивница, контактный дерматит, шелушение кожи, эритема. Общие расстройства и реакции в месте введения: Очень редко: боль, раздражение и отек в месте введения.

Передозировка

Случаи передозировки не зарегистрированы.

Особые указания

Применение при беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. В период лактации применяют с осторожностью.Следует избегать попадания эконазола в глаза.

Условия хранения

В сухом месте