Инструкция по применению
Гино-Певарил суппозитории вагинальные 50 мг 15 шт

Характеристики



Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Китайская Народная Республика
Производитель: Сянь-Янссен Фармасьютикал
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Эконазол
Количество в упаковке: 15
Дозировка действующего вещества: 50 мг

Описание

Суппозитории от белого до почти белого цвета, торпедообразной формы.

Действующее вещество

Эконазол

Состав

1 суппозиторий вагинальный содержит:Активное вещество: эконазола нитрат - 50 мг.
Вспомогательные вещества: твердый жир (тип А и тип Б).

Форма выпуска

Суппозитории

Фармакокинетика

Эконазола нитрат слабо всасывается, после введения во влагалище абсорбируется около 5% введенной дозы. Максимальные концентрации эконазола и/или его метаболитов в крови наблюдаются на 1-2 день после применения и достигают 15 нг /мл для суппозиториев с дозировкой 50 мг и 65 нг/мл для суппозиториев с дозировкой 150 мг.Эконазол и/или его метаболиты прочно связываются с сывороточными белками (98%). Эконазол подвергается активному метаболизму путем окисления, дезаминирования, и О-дезалкилирования, его метаболиты выводятся почками и через кишечник.

Показания

Гино-Певарил® показан для лечения вульвовагинальный микозов.

Способ применения и дозы

Интравагинально.Суппозитории по 50 мгВагинальный суппозиторий вводят глубоко во влагалище, в положении лежа, непосредственно перед сном в течение не менее 14 дней. Необходимо провести полный курс лечения, несмотря на исчезновение субъективных симптомов (зуд, бели).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.Детский возраст до 16 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

БеременностьИсследования на животных показали репродуктивную токсичность. Данные о применении препарата Гино-Певарил® у беременных женщин отсутствуют. Эконазол способен всасываться из влагалища в системный кровоток, поэтому при беременности препарат Гино-Певарил® применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.Период грудного вскармливанияУ крыс эконазол и/или его метаболиты выделяются с грудным молоком и были обнаружены у потомства. Неизвестно, проникает ли эконазол в грудное молоко человека. В период грудного вскармливания препарат Гино-Певарил® применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Побочные действия

При применении Гино-Певарила может наблюдаться местное раздражение, чувство жжения, зуд, эритема, сыпь. Известны отдельные случаи возникновения аллергических реакций, таких как ангионевротический отек и крапивница.Побочные действия препарата систематизированы по органам и частоте появления с использованием следующей классификации: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, Со стороны иммунной системы:Очень редко: гиперчувствительность.Со стороны кожи и подкожных тканей:Очень редко: ангионевротический отек, крапивница, контактный дерматит, шелушение кожи, эритема.Общие расстройства и реакции в месте введения: Очень редко: боль, раздражение и отек в месте введения.

Передозировка

Предполагается, что явления, связанные с передозировкой или неправильным применением препарата Гино-Певарил®, представляют собой нежелательные явления, перечисленные в разделе «Побочное действие». При случайном приеме препарата внутрь при необходимости следует проводить симптоматическую терапию. При случайном попадании препарата в глаза следует немедленно промыть их чистой водой или соляным раствором и, в случае необходимости, обратиться за медицинской помощью.

Взаимодействие с другими препаратами

Эконазол является ингибитором изофермента CYP3A4/2C29. Однако, принимая во внимание, что препарат слабо всасывается в системный кровоток, возникновение клинически значимых взаимодействий маловероятно, хотя и имело место при приеме пероральных антикоагулянтов. Пациенты, принимающие непрямые антикоагулянты, такие как варфарин и аценокумарол, должны соблюдать осторожность и следить за параметрами свертываемости крови.

Особые указания

Препарат предназначен только для интравагинального применения. Не предназначен для приема внутрь.При случайном попадании препарата в глаза следует немедленно промыть их чистой водой или соляным раствором и, в случае необходимости, обратиться за медицинской помощью. Одновременное применение латексных презервативов или диафрагм и вагинальных противоинфекционных препаратов может снижать эффективность латексных барьерных контрацептивов. По этой причине Гино-Певарил® не рекомендуется использовать одновременно с диафрагмой или презервативом. Пациенты, использующие спермицидные контрацептивы, должны посоветоваться со своим врачом, поскольку препараты, принимаемые для интравагинального введения, могут инактивировать спермицидный контрацептив. Гино-Певарил® не следует применять в сочетании с другими препаратами для лечения заболеваний гениталий, назначаемыми внутрь или наружно.В случае возникновения выраженного раздражения или повышенной чувствительности лечение Гино-Певарилом необходимо прекратить.У пациентов, чувствительных к имидазолам, возможна повышенная чувствительность и к эконазола нитрату.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Не влияет на способность управлять транспортными средствами.

Условия хранения

Хранить при температуре от 15 до 30 °C.Хранить в недоступном для детей месте.