Инструкция по применению
Гинос таблетки 40 мг 30 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Россия
Производитель: Верофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гинкго двулопастного листьев экстракт
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 40 мг
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Гинкго двулопастного листьев экстракт

Состав

Сухой экстракт листьев гинкго двулопастного 40 мг;содержание суммы флавоноидов 24% ;Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал кукурузный, поливинилпирролидон (повидон), карбоксиметилкрахмал натрия (примогель), магния стеарат, кремния диоксид коллоидный (аэросил).;Состав оболочки: Opadry II.

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Фармакокинетика

Фармакокинетические параметры экстракта гинкго билоба трудно поддаются оценке из-за многокомпонентного состава экстракта.

Показания

— дисциркуляторная энцефалопатия различной этиологии (инсульт, черепно-мозговая травма, престарелый возраст), проявляющаяся следующими симптомами: снижение внимания, нарушения памяти, нарушение интеллектуальных способностей, чувство тревоги, страха, нарушения сна; — нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции (в т.ч. артериопатия нижних конечностей), синдром Рейно; — нейросенсорные нарушения, проявляющиеся головокружением, шумом в ушах, неустойчивостью походки.

Способ применения и дозы

Для симптоматической терапии расстройств мозгового кровообращения препарат назначают по 1-2 таб. 3 раза/сут. Продолжительность терапии - не менее 8 недель.; При нарушениях периферического кровообращения по 1 таб. 3 раза/сут. Продолжительность терапии - 6-8 недель.;При нейросенсорных нарушениях препарат назначают по 1 таб. 3 раза/сут. Продолжительность курса терапии - 6-8 недель.;При необходимости возможно назначение повторных курсов терапии.;Таблетки, покрытые оболочкой, следует принимать утром, днем и вечером, независимо от приема пищи, проглатывать целиком, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.;Если прием таблетки был пропущен или принята недостаточная доза, последующий прием проводят как указано, без каких-либо изменений.

Противопоказания

— пониженная свертываемость крови; — язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения; — эрозивный гастрит; — детский возраст до 12 лет; — беременность; — лактация (грудное вскармливание); — повышенная чувствительность к компонентам препарата.;С осторожностью назначают при острых нарушениях мозгового кровообращения, артериальной гипотензии.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Со стороны ЦНС: редко - головная боль.;Со стороны пищеварительной системы: редко - явления диспепсии.;Аллергические реакции: возможны кожная сыпь, зуд.;Прочие: снижение свертываемости крови.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение препарата одновременно с ацетилсалициловой кислотой и пероральными антикоагулянтами не рекомендуется.

Особые указания

Не следует превышать рекомендованные дозы препарата.;Улучшение состояния обычно наблюдается через 1 месяц терапии.;На фоне применения препарата не следует употреблять алкоголь.

Условия хранения

В сухом месте