Инструкция по применению
Гиоксизон мазь 10 г

Характеристики



Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Муромский ПСЗ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гидрокортизон+Окситетрациклин
Количество в упаковке: 1

Описание

Мазь желтого цвета.

Действующее вещество

Гидрокортизон+Окситетрациклин

Состав

1 г препарата содержит:Активные вещества: гидрокортизона ацетат - 10,0 мг, окситетрациклина гидрохлорид - 25800 ЕД (30,0 мг),Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат - 0,2 мг, парафин жидкий - 48,0 мг, вазелин до 1 г.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

При наружном применении препарата в терапевтических дозах трансдермальное всасывание действующих веществ в кровь очень незначительное.Применение окклюзионных повязок повышает трансдермальное всасывание гидрокортизона и окситетрациклина, что может приводить к увеличению риска развития системных побочных эффектов.

Показания

Заболевания кожи, поддающиеся терапии глюкокортикостероидами и осложненные вторичной бактериальной инфекцией, вызванной чувствительными к окситетрациклину микроорганизмами: дерматит (в том числе аллергический, контактный, себорейный, солнечный, атопический), экзема, многоформная экссудативная эритема, поверхностные ожоги и отморожения, укусы насекомых.

Способ применения и дозы

Наружно.Наносят тонким слоем 0,5-1 г 1-3 раза в сутки на пораженные участки или на стерильную марлю, которой прикрывают кожу, перевязав бинтом. Длительность лечения индивидуальна и зависит от степени поражения и локализации. Курс лечения не должен превышать двух недель.При применении препарата на коже лица мазь наносится один раз в сутки тонким слоем или точечно на элементы, избегая нанесения на периорбитальную область. При этом курс лечения не должен превышать 7-10 дней.У детей старше 2-х лет применяют на ограниченных участках кожи коротким курсом (в течение 5-7 дней).

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, туберкулез кожи, опухоли кожи, предраковые заболевания кожи, дерматомикоз, вирусные заболевания кожи (герпес, ветряная оспа), розацеа и периоральный дерматит, сифилитические поражения кожи, поствакцинальные кожные реакции, беременность, период лактации, детский возраст до 2 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период лактации противопоказано.

Побочные действия

Раздражение кожи, зуд, сыпь, суперинфекция, аллергические реакции.При применении на коже лица: телеангиэктазии, атрофия подкожной клетчатки в области рта.При длительном применении и/или нанесении на большие поверхности - системные побочные эффекты глюкокортикостероидов.

Передозировка

Симптомы: при длительном применении и/или в высоких дозах возможно подавление функции надпочечников с развитием вторичной надпочечниковой недостаточности и симптомов гиперкортицизма, включая синдром Иценко-Кушинга.Длительное лечение окситетрациклином в повышенных дозах может привести к росту нечувствительной микрофлоры.Лечение: отмена препарата. Соответствующая симптоматическая терапия. При необходимости - коррекция электролитных нарушений.

Взаимодействие с другими препаратами

Нет данных.

Особые указания

Во время лечения глюкокортикостероидами не следует проводить вакцинацию против оспы и планировать другие виды иммунизации в связи с иммунодепрессивным эффектом глюкокортикостероидов.Следует избегать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки.У детей следует избегать нанесения препарата на обширные поверхности кожи и под окклюзионные повязки.При необходимости применения препарата на коже лица, лечение должно быть коротким, в связи с повышенным всасыванием и возможностью появления побочного действия.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Не влияет на способность к управлению транспортными средствами и механизмами.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.