
# Инструкция по применению
# Гиоксизон-Акрихин Мазь для наружного применения 10 г

## Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Акрихин
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гидрокортизон+Окситетрациклин
Количество в упаковке: 1




## Описание

Мазь желтого цвета.

## Действующее вещество

Гидрокортизон+Окситетрациклин

## Состав

100 г мази содержат: активные вещества: гидрокортизона ацетат в пересчете на 100 % вещество – 1 г, окситетрациклина гидрохлорид в пересчете на 100 % вещество – 3 г вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат – 0,02 г, парафин жидкий (вазелиновое масло) – 4,8 г, вазелин до 100 г.

## Форма выпуска

Мазь

## Фармакокинетика

При наружном применении препарата в терапевтических дозах трансдермальное всасывание действующих веществ в кровь очень незначительное. Применение окклюзионных повязок повышает трансдермальное всасывание гидрокортизона и окситетрациклина, что может приводить к увеличению риска развития системных побочных эффектов.

**Показания**

Заболевания кожи, поддающиеся терапии глюкокортикостероидами и осложненные вторичной бактериальной инфекцией, вызванной чувствительными к окситетрациклину микроорганизмами: дерматит (в том числе аллергический, контактный, себорейный, солнечный, атопический), экзема, многоформная экссудативная эритема, поверхностные ожоги и отморожения, укусы насекомых.

**Способ применения и дозы**

Наружно. Наносят тонким слоем 0,5-1 г 1-3 раза в сутки на пораженные участки или на стерильную марлю, которой прикрывают кожу, перевязав бинтом. Длительность лечения индивидуальна и зависит от степени поражения и локализации. Курс лечения не должен превышать 14 дней. При применении на коже лица мазь наносится 1 раз в сутки, избегая нанесения на периорбитальную область, при этом курс лечения не должен превышать 7-10 дней. У детей применяют на ограниченных участках кожи коротким курсом (в течение 5-7 дней).

**Противопоказания**

Гиперчувствительность, туберкулез кожи, опухоли кожи, предраковые заболевания кожи, дерматомикоз, вирусные заболевания кожи (герпес, ветряная оспа), розацеа и периоральный дерматит, сифилитические поражения кожи, поствакцинальные кожные реакции беременность, период лактации, детский возраст до 2 лет.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Применение препарата противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания.

**Побочные действия**

Раздражение кожи, зуд, сыпь суперинфекция, аллергические реакции. При применении на коже лица: телеангиэктазии, атрофия подкожной клетчатки в области рта. При длительном применении и/или нанесении на большие поверхности – системные побочные эффекты глюкокортикостероидов.

**Передозировка**

Симптомы: при длительном применении и/или в высоких дозах возможно подавление функции надпочечников с развитием вторичной надпочечниковой недостаточности и симптомов гиперкортицизма, включая синдром Иценко-Кушинга. Длительное лечение окситетрациклином в повышенных дозах может привести к росту нечувствительной микрофлоры. Лечение: отмена препарата. Соответствующая симптоматическая терапия. При необходимости - коррекция электролитных нарушений.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.

**Особые указания**

Во время лечения глюкокортикостероидами не следует проводить вакцинацию против оспы и планировать другие виды иммунизации (в связи с иммуно-депрессивным эффектом глюкокортикостероидов). Следует избегать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки. У детей следует избегать нанесения препарата на обширные поверхности кожи и под окклюзионные повязки. При необходимости применения препарата на коже лица, лечение должно быть коротким из-за повышенного всасывания и возможности появления побочного действия.

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 С. Хранить в недоступном для детей месте.