Инструкция по применению
Гипоксен Капсулы 250 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Олифен
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество:
Полидигидроксифенилентиосульфонат натрия
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 250 мг
Срок годности: 48.0

Описание

твердые желатиновые капсулы №3 темно-коричневого цвета. На капсуле белой краской (титана диоксид) нанесен логотип предприятия-изготовителя. Содержимое капсул - порошок черного цвета без запаха или со слабым специфическим запахом.

Действующее вещество

Полидигидроксифенилентиосульфонат натрия

Состав

Активное вещество: полидигидроксифенилентиосульфонат натрия (гипоксен®) 250 мг материал капсулы: желатин, железа оксид черный (Е 172), железа оксид красный (Е 172), железа оксид желтый (Е 172), титана диоксид (Е 171).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

• для повышения работоспособности в экстремальных и неблагоприятных условиях, сопровождающихся недостатком кислорода (высокогорье, условия Заполярья, подводные работы и др.) • умственное и физическое перенапряжение, операторская деятельность и другие интенсивные нагрузки, сопровождающиеся хронической усталостью и утомляемостью • в комплексной терапии тяжелых травматических поражений, кровопотери, обширных оперативных вмешательств, заболеваний органов дыхания (бронхиальная астма, пневмония, обструктивный бронхит) • в составе комплексной терапии стабильной стенокардии (профилактика приступов стенокардии), артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности I и II ФК по NYHA.

Способ применения и дозы

Применять у взрослых внутрь, до или во время еды, с небольшим количеством воды. Разовая доза для взрослых составляет 2 - 4 капсулы. Максимально применяемая суточная доза 12 капсул. Расчет суточной дозы на массу тела приведен в таблице. Масса тела (кг) Суточная доза (капсулы) 60-70 3-4 70-80 4-6 80-90 6-8 90-100 8-10 100-120 10-12 Устранение гипоксии, развивающейся в экстремальных условиях: гиповентиляция лёгких, высокогорье, подводные работы, работа в условиях повышенной температуры, занятия спортом: 1 суточная доза за 30-60 минут перед нагрузкой. Длительная напряженная умственная деятельность, хроническая усталость, сокращение восстановительного периода после перенесенных чрезмерных физических нагрузок, травм, оперативных вмешательств: ½ суточной дозы 2 раза в день в течение 2-3 недель. Курсы можно повторять с перерывом на 1-2 недели. Комплексное лечение пневмонии: ½ суточной дозы 2 раза в день, курс 14 дней. Комплексное лечение обструктивного бронхита: по ½ суточной дозы 2 раза в день – 2 курса по 14 дней с интервалом 7 дней. Комплексное лечение бронхиальной астмы: ½ суточной дозы 2 раза в день курсы по 21-30 дней с интервалом 10 дней. Комплексная профилактика стабильной стенокардии: ½ суточной дозы 2 раза в день, курс 15-30 дней с интервалом 10 дней. Комплексное лечение гипертонической болезни: ½ суточной дозы 2 раза в день, курс 10 дней. Комплексное лечение сердечной недостаточности: ½ суточной дозы 2 раза в день, курс 10-14 дней.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость, беременность, период лактации, геморрагический инсульт.

Побочные действия

Индивидуальная непереносимость препарата, аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы: сухость во рту, тошнота и ощущение дискомфорта в животе, в редких случаях - угнетение дыхания. Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Отрицательных фармацевтических, фармакодинамических и фармакокинетических взаимодействий с другими лекарственными средствами не установлено. Несовместимости препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.

Условия хранения

В сухом месте