Инструкция по применению
Гипоксен Капсулы 250 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество:
Полидигидроксифенилентиосульфонат натрия
Количество в упаковке: 30

Описание

Твердые желатиновые капсулы темно-коричневого цвета. Содержимое капсул - порошок черного цвета без запаха или со слабым специфическим запахом.

Действующее вещество

Полидигидроксифенилентиосульфонат натрия

Состав

Состав на 1 капсулу: _Действующее вещество:_ полидигидроксифенилентиосульфонат натрия - 250,0 мг. _Вспомогательные вещества:_ капсула твердая желатиновая № 3 - 1 шт. Состав корпуса и крышечки капсулы: Компонент Содержание, _%_ Титана диоксид (Е171) 0,6528 Краситель железа оксид черный (Е172) 0,0890 Краситель железа оксид красный (Е172) 0,0890 Краситель железа оксид желтый (Е172) 0,6120 Желатин 98,5572

Форма выпуска

Капсулы

Показания

* Для повышения работоспособности в экстремальных и неблагоприятных условиях, сопровождающихся недостатком кислорода (высокогорье, условия Заполярья, подводные работы и др.), * умственное и физическое перенапряжение, операторская деятельность и другие интенсивные нагрузки, сопровождающиеся хронической усталостью и утомляемостью, * в комплексной терапии тяжелых травматических поражений, кровопотери, обширных оперативных вмешательств, заболеваний органов дыхания (бронхиальная астма, пневмония, обструктивный бронхит), * в составе комплексной терапии стабильной стенокардии (профилактика приступов стенокардии), артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности I и II ФК по NYHA.

Способ применения и дозы

Применять у взрослых внутрь, до или во время еды, с небольшим количеством воды. Разовая доза для взрослых составляет 2-4 капсулы. Максимально применяемая суточная доза 12 капсул. Расчет суточной дозы на массу тела приведен в таблице. Масса тела (кг) Суточная доза (капсулы) 60-70 3-4 70-80 4-6 80-90 6-8 90-100 8-10 100-120 10-12 _Устранение гипоксии, развивающейся в экстремальных условиях: гиповентиляция легких, высокогорье, подводные работы, работа в условиях повышенной температуры, занятия спортом:_ 1 суточная доза за 30-60 минут перед нагрузкой. _Длительная напряженная умственная деятельность, хроническая усталость, сокращение восстановительного периода после перенесенных чрезмерных физических нагрузок, травм, оперативных вмешательств:_ 1/2 суточной дозы 2 раза в день в течение 23 недель. Курсы можно повторять с перерывом на 1-2 недели. _Комплексное лечение пневмонии:_ 1/2 суточной дозы 2 раза в день, курс 14 дней. _Комплексное лечение обструктивного бронхита:_ по 1/2 суточной дозы 2 раза в день - 2 курса по 14 дней с интервалом 7 дней. _Комплексное лечение бронхиальной астмы:_ 1/2 суточной дозы 2 раза в день, курсы по 21-30 дней с интервалом 10 дней. _Комплексная профилактика стабильной стенокардии:_ 1/2 суточной дозы 2 раза в день, курс 15-30 дней с интервалом 10 дней. _Комплексное лечение гипертонической болезни:_ 1/2 суточной дозы 2 раза в день, курс 10 дней. _Комплексное лечение сердечной недостаточности:_ 1/2 суточной дозы 2 раза в день, курс 10-14 дней.

Противопоказания

Гиперчувствительность к полидигидроксифенилентиосульфонату натрия или к любому из вспомогательных веществ, беременность, период грудного вскармливания, геморрагический инсульт.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Классификация частоты возникновения побочных реакций: очень часто (⩾ 1/10), часто (⩾ 1/100, но < 1/10), нечасто (⩾ 1/1000, но < 1/100), редко (⩾ 1/10000, но < 1/1000), очень редко (< 1/10000), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно). Индивидуальная непереносимость препарата, аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы: сухость во рту, тошнота и ощущение дискомфорта в животе, в редких случаях - угнетение дыхания. _Лечение:_ промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Отрицательных фармацевтических, фармакодинамических и фармакокинетических взаимодействий с другими лекарственными средствами не установлено. Несовместимости препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания

Данные отсутствуют. Не выявлено.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.