
Инструкция по применению
Гипосарт Таблетки 16 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Акрихин
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Кандесартан
Количество в упаковке: 1



Описание

Гипосарт, 16 мг, таблетки Круглые двояковыпуклые таблетки розового цвета, с риской. Допускается наличие мраморности и вкраплений.

Действующее вещество

Кандесартан

Состав

Препарат Гипосарт содержит: Действующим веществом является кандесартана цилексетил.Гипосарт, 16 мг, таблетки Каждая таблетка содержит 16 мг кандесартана цилексетила. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: гипролоза, макрогол, лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, краситель железа оксид красный (Е172), кармеллоза кальция, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат Гипосарт показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет при: артериальной гипертензии (повышенном артериальном давлении). хронической сердечной недостаточности (ХСН) и нарушении систолической функции левого желудочка (сниженной сократительной способности мышцы сердца) (ФВЛЖ ⩽ 40 %) в качестве дополнительной терапии к ингибиторам АПФ (ангиотензинпревращающего фермента) или при непереносимости ингибиторов АПФ.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом. Рекомендуемая доза Рекомендуемая начальная доза составляет 0,25 мг один раз в неделю. Максимальная поддерживающая (терапевтическая) доза составляет 2,4 мг один раз в неделю. Доза должна постепенно увеличиваться в течение 16 недель до достижения поддерживающей (терапевтической) дозы 2,4 мг. Врач будет рекомендовать Вам увеличивать дозу каждые 4 недели, как указано в таблице ниже, пока Вы не достигнете дозы 2,4 мг. Не превышайте поддерживающую (терапевтическую) дозу 2,4 мг. В случае, если во время увеличения дозы или после достижения поддерживающей (терапевтической) дозы у Вас появятся симптомы желудочно-кишечного расстройства (продолжительная тошнота, рвота или диарея), сообщите об этом лечащему врачу. Возможно, врач отложит Вам увеличение дозы препарата или снизит до предыдущей дозы, пока нежелательные симптомы не пройдут. Схема увеличения дозы Неделя терапии Доза в неделю/одна инъекция Неделя 1-4 0,25 мг Неделя 5-8 0,5 мг Неделя 9-12 1 мг Неделя 13-16 1,7 мг Поддерживающая (терапевтическая) доза/ 17 неделя и далее 2,4 мг Путь и (или) способ введения Препарат Велгия вводится подкожно. Препарат Велгия нельзя вводить внутривенно или внутримышечно. Препарат вводят один раз в неделю, в любое время суток, независимо от приема пищи. Препарат следует вводить подкожно в область живота, бедра или верхней части плеча. Место инъекции можно менять. При необходимости день еженедельного введения можно менять при условии, что интервал времени между двумя инъекциями составляет не менее 3-х дней (более 72 часов). После выбора нового дня введения следует продолжить введение препарата один раз в неделю. Перед введением препарата Велгия внимательно ознакомьтесь с инструкцией по использованию шприц-ручки, прилагаемой к упаковке. Проконсультируйтесь с лечащим врачом перед первым введением препарата Велгия. Пациенты с сахарным диабетом 2 типа (СД2) Предупредите лечащего врача, если у Вас сахарный диабет 2 типа (СД2). Ваш врач может скорректировать дозу принимаемых Вами лекарственных препаратов для лечения диабета, чтобы предотвратить резкое снижение уровня сахара в крови (гипогликемию).

Противопоказания

Не принимайте препарат Гипосарт: - если у Вас аллергия на кандесартан или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша), если Вы беременны или кормите ребенка грудью, если у Вас диагностированы тяжелые нарушения функции печени и/или застой желчи (холестаз), если Ваш возраст моложе 18 лет, если у Вас непереносимость молочного сахара (лактозы), дефицит фермента, который вырабатывается клетками слизистой оболочки тонкой кишки и принимает участие в расщеплении молочного сахара лактозы (лактазы), синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции, если Вы одновременно применяете другой препарат для понижения артериального давления - алискирен и препараты, содержащие алискирен, если у Вас сахарный диабет и/или умеренные или тяжелые нарушения функции почек (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60 мл/мин/1,73 м2 площади поверхности тела), если у Вас диагностирована диабетическая нефропатия и Вы одновременно применяете ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Если Вы считаете, что любое из перечисленного относится к Вам, сообщите об этом Вашему лечащему врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность Не принимайте препарат Гипосарт при беременности. Врачу следует проинформировать женщин детородного возраста о потенциальной опасности применения этого препарата во время беременности. Препараты кандесартана могут вызывать нарушение развития плода (нарушение функции почек, маловодие, замедление окостенения костей черепа) или оказывать негативное действие на новорожденного (почечная недостаточность, понижение артериального давления, повышение уровня калия в крови), вплоть до смертельного исхода. Если беременность диагностирована в период лечения препаратом Гипосарт, препарат следует отменить как можно скорее. Грудное вскармливание Не принимайте препарат Гипосарт во время грудного вскармливания. Неизвестно, проникает ли кандесартан в грудное молоко. При необходимости применения препарата в период лактации, грудное вскармливание необходимо прекратить.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Велгия может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Прекратите прием препарата и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих признаков тяжелой аллергической реакции

(анафилактические реакции, ангионевротический отек), могут возникать редко (не более чем у 1 человека из 1000): затрудненное дыхание или глотание головокружение предобморочное состояние (падение артериального давления) с учащенным сердцебиением и повышенным потоотделением отек лица, губ, языка или горла сильный зуд кожи, появление сыпи или волдырей Если у Вас сахарный диабет, Вам следует сообщить лечащему врачу, если во время лечения препаратом Велгия у Вас возникнет резкое нарушение зрения, это может быть признаком обострения диабетической ретинопатии, которое может возникать часто (не более чем у 1 человека из 10). Прекратите прием препарата и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного или нескольких из следующих симптомов воспаления поджелудочной железы (острого панкреатита), которое может возникать нечасто (не более чем у 1 человека из 100): сильная и продолжительная боль в животе, которая может отдавать в спину боль по всему животу ухудшение состояния (выраженная слабость, потливость, учащенное сердцебиение) повышение температуры тела Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Велгия Очень часто - могут возникать у более чем 1 человека из 10 (В основном проявляются при увеличении дозы и обычно проходят со временем) головная боль тошнота рвота диарея запор боль в животе чувство слабости, усталость Часто - могут возникать не более чем у 1 человека из 10 головокружение боль в животе, тошнота и/или рвота (гастрит) изжога, отрыжка, кислый или горький привкус во рту, ощущение кома в горле (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) боль, дискомфорт, чувство переполнения, тяжести, раннее насыщение в животе (диспепсия) отрыжка газы (метеоризм) вздутие живота камни в желчном пузыре (желчекаменная болезнь) выпадение волос реакции в месте инъекции низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) у пациентов с СД2* * Признаки низкого уровня сахара в крови могут проявиться внезапно. К ним могут относиться: холодный пот, бледность кожи, головная боль, учащенное сердцебиение, плохое самочувствие (тошнота), сильный голод, изменения зрения, сонливость или слабость, нервозность, беспокойство или растерянность, трудности с концентрацией внимания или дрожь. Ваш врач расскажет Вам, как повысить низкий уровень сахара в крови и что делать, если Вы заметили эти тревожные признаки. Вероятность снижения уровня сахара в крови выше, если Вы также принимаете препараты сульфонилмочевины или инсулин. Ваш врач может снизить дозу этих препаратов, прежде чем Вы начнете применять препарат Велгия. Нечасто - могут возникать не более чем у 1 человека из 100 аллергические реакции (гиперчувствительность) изменение вкусовых ощущений (дисгевзия) низкое артериальное давление (гипотензия) ощущение головокружения в положении стоя или сидя из-за низкого артериального давления (ортостатическая гипотензия) увеличение частоты сердечных сокращений задержка опорожнения желудка увеличение уровня ферментов

поджелудочной железы (амилазы, липазы), определяется по анализу крови Неизвестно - исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно нарушение работы кишечника, связанное с нарушением его двигательной функции (кишечная непроходимость) воспаление желчных протоков (холангит) нарушение оттока желчи из желчного пузыря в 12-перстную кишку (холестатическая желтуха)

Передозировка

Если Вы приняли препарата Гипосарт больше, чем следовало, сообщите об этом врачу или немедленно обратитесь в медицинское учреждение. Симптомы Выраженное снижение АД, головокружение. Лечение При выраженном снижении АД перевести пациента в положение лежа на спине, ноги приподнять.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие лекарственные препараты. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы этих лекарственных препаратов или принять другие меры предосторожности. В некоторых случаях Вам придется прекратить прием некоторых лекарственных препаратов или препарата Гипосарт. Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете какой-либо из нижеперечисленных препаратов: другие препараты для снижения артериального давления, такие как ингибиторы АПФ или алискирен. Одновременный прием с препаратом кандесартана может привести к еще большему понижению артериального давления, повышению уровня калия в крови и изменению функции почек, средства, восполняющие калий, заменители солей, содержащих калий (препараты, повышающие уровень калия в крови). Одновременный прием с препаратом кандесартана может вызвать повышение уровня калия в крови, гепарин (препарат, предотвращающий свертывание крови). Одновременный прием с препаратом кандесартана может вызвать повышение уровня калия в крови, литий (лекарственный препарат, применяемый при психических расстройствах). Одновременный прием с препаратом кандесартана может вызвать обратимое повышение уровня лития в крови и развитие токсических реакций, определенный тип болеутоляющих средств, называемый нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП). Одновременный прием с препаратом кандесартана может приводить к снижению эффекта понижения артериального давления, увеличивать риск возникновения нарушения функции почек и повышение уровня калия в крови, ацетилсалициловая кислота (в дозе большей чем 3 г в сутки) (препарат, уменьшающий боль и воспаление). Одновременный прием с препаратом кандесартана может приводить к снижению эффекта понижения артериального давления.

Особые указания

Дети и подростки Препарат Гипосарт не предназначен для применения у детей и подростков до 18 лет. Препарат Гипосарт содержит лактозы моногидрат Препарат Гипосарт содержит лактозы моногидрат. Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Во время применения лекарственного препарата Гипосарт некоторые пациенты могут чувствовать усталость и головокружение. В случае появления таких симптомов следует воздержаться от управления транспортными средствами и обслуживания механизмов.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Храните при температуре не выше 30 оС, в оригинальной упаковке (контурная ячейковая упаковка в пачке).