Инструкция по применению
Гирель Таблетки для рассасывания гомеопатические 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 50
Срок годности: 36



Описание

Биорегуляционный немецкий препарат. Применяется в качестве симптоматического средства при ОРВИ и гриппе (головная боль, повышение температуры, потеря аппетита, слабость).

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на 1 таблетку): Активные компоненты: Aconitum napellus (Аконитум напеллус) D4 120 мг, Bryonia (Бриония) D4 60 мг, Lachesis mutus (Лахезис мутус) D12 60 мг, Eupatorium perfoliatum (Эупаториум перфолиатум) D3 30 мг, Phosphorus (Фосфорус) D5 30 мг, Вспомогательные вещества: магния стеарат 1,5 мг, лактозы моногидрат до получения таблетки массой около 0,302 г.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве симптоматического средства при острых респираторных вирусных инфекциях, в том числе гриппе (головная боль, повышение температуры, потеря аппетита, слабость).

Способ применения и дозы

Взрослые и дети старше 12 лет принимают по 1 таблетке 3 раза в день. Дети в возрасте от 6 до 12 лет принимают по 1 таблетке 2 раза в день. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. При остром начале заболевания принимать по 1 таблетке каждые полчаса или час, но не более 12 таблеток в день – для взрослых и детей старше 12 лет, не более 8 таблеток в день для детей от 6 до 12 лет. Если в течение 6 часов не происходит улучшения состояния больного, необходимо обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 6 лет в связи с недостаточностью клинических данных. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. При обнаружении побочных эффектов, в том числе не описанных в инструкции, следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение), в этом случае следует прервать прием препарата и проконсультироваться с врачом. Информация для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы. Пенал закрывать сразу после применения препарата.

Условия хранения

В сухом темном месте