Инструкция по применению
Гистафен Таблетки 50 мг 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Латвия
Производитель: OlainFarm
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Сехифенадин
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 50 мг

Описание

Гистафен в таблетках - антигистаминный препарат. Эффективно снимает отеки, зуд, покраснения и другие проявления аллергии.

Действующее вещество

Сехифенадин

Состав

Сехифенадин (в форме гидрохлорида), моногидрат лактозы, микрокристаллическая целлюлоза, кукурузный крахмал, диоксид кремния, стеарат магния.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Быстро всасывается из ЖКТ. Cmax действующего вещества в плазме крови достигается через 1–2 ч. Накапливается преимущественно в легких, печени, самая низкая концентрация — в головном мозге. Метаболизируется путем окисления, образуя фармакологически неактивный метаболит. 50% дозы выводятся из организма через кишечник, более 20% — почками. Около 30% дозы выводятся в неизмененном виде, 40–50% — в виде метаболитов.

Показания

Аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, поллиноз, крапивница, отек Квинке, аллергические зудящие дерматозы (в т.ч. атопический дерматит), профилактика заболеваний аллергического характера до периода их сезонного обострения и поддерживающая терапия.

Способ применения и дозы

Гистафен следует принимать внутрь после еды, запивая водой. Взрослым при острых и хронических аллергических заболеваниях назначают по 50-100 мг 2-3 раза/сут. Обычно терапевтический эффект наступает через 3 дня после начала лечения. Длительность курса лечения составляет 5-15 дней.С целью профилактики заболеваний аллергического характера до периода их сезонного обострения и для поддерживающей терапии назначают по 50 мг 2 раза/сут. Прием препарата рекомендуется начать за 2 недели до ожидаемого воздействия сезонного аллергена.

Противопоказания

Бронхиальная астма, одновременное применение ингибиторов МАО, повышенная чувствительность к компонентам препарата, в состав таблетки входит лактоза, поэтому препарат не следует применять при дефиците лактазы, редкой наследственной непереносимости лактозы или глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано

Побочные действия

Сухость во рту, боль в эпигастрии, диспепсия, усиление аппетита. Головная боль, сонливость, при применении в высоких дозах возможны возбуждение, бессонница.

Передозировка

Симптомы: сухость слизистых оболочек, головная боль, рвота, боль в животе. Лечение: симптоматическая терапия. Антидот неизвестен.

Взаимодействие с другими препаратами

Не усиливает угнетающее действие снотворных средств и алкоголя на ЦНС, однако в период лечения следует воздержаться от употребления алкоголя.

Особые указания

Пациентам, работа которых требует быстрых психомоторных реакций (в т.ч. водители транспорта), в период лечения необходимо воздержаться от вождения транспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности.