Инструкция по применению
Глемаз таблетки 4мг N30

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Аргентина
Производитель: Валеант
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Глимепирид
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 4 мг

Описание

Таблетки Глемаз стимулируют клетки поджелудочной железы, способствуя мобилизации и усилению выброса эндогенного инсулина, увеличивает количество инсулинчувствительных рецепторов в клетках-мишенях, угнетает глюконеогенез.

Действующее вещество

Глимепирид

Состав

1 таблетка содержит: активные вещества: глимепирид 4 мг, вспомогательные вещества: кроскармеллоза натрия, целлюлоза, стеарат магния, краситель хинолиновый желтый, краситель бриллиантовый голубой, МКЦ.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Сахарный диабет типа 2 (в монотерапии или в составе комбинированной терапии с метформином или инсулином).

Способ применения и дозы

Доза препарата устанавливается индивидуально на основании результатов регулярного контроля содержания глюкозы в крови. Начальная доза составляет 1 мг 1 раз/сут. При необходимости суточная доза может быть увеличена постепенно (на 1 мг каждые 1-2 недели) до 2, 3 или 4 мг. Только в отдельных случаях эффект терапии достигается при приеме препарата в дозе более 4 мг/сут.

Противопоказания

Сахарный диабет типа 1, диабетический кетоацидоз , диабетическая прекома и кома, тяжелые нарушения функции печени, тяжелые нарушения функции почек, состояния, требующие перевода на инсулинотерапию, обширные ожоги, тяжелые травмы, большие хирургические вмешательства, нарушения всасывания в ЖКТ, в т.ч. при кишечной непроходимости, парезе желудка.

Применение при беременности и кормлении грудью

Глемаз противопоказан к применению при беременности. В случае планируемой беременности или при наступлении беременности рекомендуется проведение инсулинотерапии.

Передозировка

Симптомы: гипогликемия, проявляющаяся чувством голода, тахикардией , тошнотой , рвотой , апатией , сонливостью, депрессией , нарушениями сна, резкой слабостью, тревожностью, снижением концентрации внимания, нарушением речи (афазия) и зрения, тремором , нарушением чувствительности, парезами , головокружением , судорогами, поверхностным дыханием, нарушением сознания, гипогликемической комой .Лечение: если пациент в сознании - немедленный прием внутрь углеводов, при невозможности приема углеводов - инъекции декстрозы (в/в болюсно - 40% раствор, затем инфузия 5-10% раствора), 1-2 мг глюкагона в/м или п/к. Необходимо постоянное наблюдение и поддержание жизненно важных функций, поддержание концентрации глюкозы в крови на уровне 5.5 ммоль/л в течение, как минимум, 24-48 ч (возможны повторные эпизоды гипогликемии). После восстановления сознания необходимо дать пациенту пищу, богатую легкоусвояемыми углеводами (во избежание повторного развития гипогликемии).

Особые указания

В период приема Глемаза необходим регулярный контроль содержания глюкозы в крови