Инструкция по применению
Гленцет таблетки 5 мг 7 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Glenmark Pharmaceuticals
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Левоцетиризин
Количество в упаковке: 7
Дозировка действующего вещества: 5 мг



Действующее вещество

Левоцетиризин

Состав

Левоцетиризина дигидрохлорид 5 мг

Форма выпуска

Таблетки

Показания

— симптоматическое лечение крапивницы, в т.ч. хронической идиопатической крапивницы . — отек Квинке . — другие аллергические дерматозы, сопровождающиеся зудом и высыпаниями.

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды или натощак, запивая небольшим количеством воды, не разжевывая. Рекомендуемая доза взрослым и детям старше 6 лет, пожилым пациентам (при условии нормальной функции почек) - 5 мг (1 таб.) 1 раз/сут. У больных с хронической почечной недостаточностью доза снижается в 2 раза (1 таб. через день) при КК от 30 до 49 мл/мин и в 3 раза (1 таб. в 3 дня) при КК от 10 до 29 мл /мин. Больным с печеночной недостаточностью коррекция режима дозирования не требуется. Курс лечения при хронических заболеваниях - до 18 месяцев.

Противопоказания

— тяжелая хроническая почечная недостаточность (ХПН, КК менее 10 мл/мин) . — непереносимость галактозы, дефицит лактазы и глюкозо-галактозная мальабсорбция . — беременность . — период лактации . — детский возраст до 6 лет . — повышенная чувствительность (в т.ч. к производным ниперазина). С осторожностью: хроническая почечная недостаточность (требуется коррекция режима дозирования), пожилой возраст (возможно снижение клубочковой фильтрации).

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Возможные побочные эффекты приведены ниже по системам организма и частоте возникновения: часто (больше1/10), нечасто (больше1/100, меньше1/10), редко (больше1/1000, меньше1/100), очень редко (больше1/10 000, меньше1/1000). Со стороны ЦНС: нечасто - головная боль, утомляемость, сонливость . редко - астения . очень редко - агрессия, возбуждение, галлюцинации, депрессия, судороги. Со стороны органов чувств: очень редко - нарушение зрения. Со стороны пищеварительной системы: нечасто - сухость слизистой оболочки полости рта . редко - боль в животе . очень редко - тошнота, диарея, гепатит. Со стороны сердечно-сосудистой системы: очень редко - тахикардия. Со стороны дыхательной системы: очень редко - диспноэ. Со стороны костно-мышечной системы: очень редко - миалгия. Со стороны обмена веществ: очень редко - увеличение массы тела. Лабораторные показатели: очень редко - изменение функциональных проб печени. Аллергические реакиии: очень редко - зуд, сыпь, крапивница, ангионевротический отек, анафилаксия.

Особые указания

Возможные побочные эффекты приведены ниже по системам организма и частоте возникновения: часто (больше1/10), нечасто (больше1/100, меньше1/10), редко (больше1/1000, меньше1/100), очень редко (больше1/10 000, меньше1/1000). Со стороны ЦНС: нечасто - головная боль, утомляемость, сонливость . редко - астения . очень редко - агрессия, возбуждение, галлюцинации, депрессия, судороги. Со стороны органов чувств: очень редко - нарушение зрения. Со стороны пищеварительной системы: нечасто - сухость слизистой оболочки полости рта . редко - боль в животе . очень редко - тошнота, диарея, гепатит. Со стороны сердечно-сосудистой системы: очень редко - тахикардия. Со стороны дыхательной системы: очень редко - диспноэ. Со стороны костно-мышечной системы: очень редко - миалгия. Со стороны обмена веществ: очень редко - увеличение массы тела. Лабораторные показатели: очень редко - изменение функциональных проб печени. Аллергические реакиии: очень редко - зуд, сыпь, крапивница, ангионевротический отек, анафилаксия.