Инструкция по применению
Гленцет Таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг 14 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Glenmark Pharmaceuticals
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Левоцетиризин
Количество в упаковке: 14
Дозировка действующего вещества: 5 мг
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Левоцетиризин

Состав

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 таб.левоцетиризина дигидрохлорид 5 мг

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Фармакокинетика носит линейный характер. Быстро всасывается при приеме внутрь; прием нищи не оказывает влияния на полноту всасывания, но снижает его скорость. Биодоступность - 100%. Время достижения Cmax в крови - 0.9 ч, Cmax в крови - 207 нг /мл. Vd - 0.4 л/кг. Связывание с белками плазмы - 90%. Менее 14% препарата метаболизируется в печени путем О-дезалкилирования с образованием фармакологически неактивного метаболита. T1/2 - 7-10 ч. Общий клиренс - 0.63 мл /мин/кг. Полностью выводится из организма в течени 96 ч. Выводится почками (85.4%). При почечной недостаточности (клиренс креатина менее 40 мл/мин) клиренс снижается (у пациентов, находящихся на гемодиализе - на 80%), T1/2 - удлиняется. Менее 10% удаляется в ходе гемодиализа. Проникает в грудное молоко.

Показания

— симптоматическое лечение крапивницы, в т.ч. хронической идиопатической крапивницы;— отек Квинке;— другие аллергические дерматозы, сопровождающиеся зудом и высыпаниями.

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды или натощак, запивая небольшим количеством воды, не разжевывая.Рекомендуемая доза взрослым и детям старше 6 лет, пожилым пациентам (при условии нормальной функции почек) - 5 мг (1 таб.) 1 раз/сут.У больных с хронической почечной недостаточностью доза снижается в 2 раза (1 таб. через день) при КК от 30 до 49 мл/мин и в 3 раза (1 таб. в 3 дня) при КК от 10 до 29 мл/мин. Больным с печеночной недостаточностью коррекция режима дозирования не требуется.Курс лечения при хронических заболеваниях - до 18 месяцев.

Противопоказания

— тяжелая хроническая почечная недостаточность (ХПН, КК менее 10 мл/мин);— непереносимость галактозы, дефицит лактазы и глюкозо-галактозная мальабсорбция; — беременность;— период лактации;— детский возраст до 6 лет;— повышенная чувствительность (в т.ч. к производным ниперазина).С осторожностью: хроническая почечная недостаточность (требуется коррекция режима дозирования), пожилой возраст (возможно снижение клубочковой фильтрации).

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Возможные побочные эффекты приведены ниже по системам организма и частоте возникновения: часто (больше1/10), нечасто (больше1/100, меньше1/10), редко (больше1/1000, меньше1/100), очень редко (больше1/10 000, меньше1/1000).Со стороны ЦНС: нечасто - головная боль, утомляемость, сонливость; редко - астения; очень редко - агрессия, возбуждение, галлюцинации, депрессия, судороги.Со стороны органов чувств: очень редко - нарушение зрения.Со стороны пищеварительной системы: нечасто - сухость слизистой оболочки полости рта; редко - боль в животе; очень редко - тошнота, диарея, гепатит.Со стороны сердечно-сосудистой системы: очень редко - тахикардия.Со стороны дыхательной системы: очень редко - диспноэ.Со стороны костно-мышечной системы: очень редко - миалгия.Со стороны обмена веществ: очень редко - увеличение массы тела.Лабораторные показатели: очень редко - изменение функциональных проб печени.Аллергические реакиии: очень редко - зуд, сыпь, крапивница, ангионевротический отек, анафилаксия.

Передозировка

Симптомы: сонливость, у детей - беспокойство, раздражительность.Лечение: промывание желудка, активированный уголь, симптоматическая терапия. Специфического антидота нет. Гемодиализ неэффективен.

Взаимодействие с другими препаратами

Теофиллин (400 мг/сут) снижает общий клиренс левоцетиризина на 16%, при этом кинетика теофиллина не изменяется.Совместное применение с макролидами или кетоконазолом не вызывало достоверных изменений на ЭКГ.Может усиливать действие средств, угнетающих ЦНС и этанола.

Особые указания

Требуется соблюдение осторожности при одновременном употреблении с алкоголем. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиПри объективной оценке достоверно не отмечено влияния препарата на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами при приеме в рекомендуемой дозе. Тем не менее, в период приема препарата целесообразно воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Беречь от детей