# Инструкция по применению
# Глево Таблетки покрытые оболочкой 500 мг 10 шт

## Характеристики

Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Индия
Производитель: Glenmark Pharmaceuticals
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Левофлоксацин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 500 мг
Срок годности: 36.0




## Действующее вещество

Левофлоксацин

## Состав

В 1 таблетке содержится: левофлоксацин (в форме гемигидрата) 500 мг
Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, повидон (повидон K-30), кросповидон, магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая (авицел pH101).
Состав пленочной оболочки: гипромеллоза, макрогол (полиэтиленгликоль 6000), дибутилфталат, тальк, титана диоксид, краситель железа оксид красный, краситель железа оксид желтый.

## Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

**Фармакокинетика**

Всасывание: При приеме внутрь быстро и практически полностью всасывается. Прием пищи мало влияет на скорость и полноту абсорбции. Биодоступность - 99%. Tmax - 1-2 ч. При приеме препарата в дозах 250 мг и 500 мг Cmax составляет 2.8 мкг/мл и 5.2 мкг/мл соответственно. Распределение: Связывание с белками плазмы - 30-40%. Хорошо проникает в органы и ткани (легкие, слизистую оболочку бронхов, мокроту, органы мочеполовой системы, полиморфноядерные лейкоциты, альвеолярные макрофаги). Метаболизм: В печени небольшая часть препарата окисляется и/или дезацетилируется. Выведение: Почечный клиренс составляет 70% общего клиренса. T1/2 - 6-8 ч. Выводится из организма преимущественно почками путем клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. Менее 5% левофлоксацина экскретируется в виде метаболитов. После приема внутрь около 70% дозы выводится с мочой в неизмененном виде в течение 24 ч, около 87% дозы - в течение 48 ч; менее 4% - с калом в течение 72 ч.

**Показания**

Бактериальные инфекции, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами, у взрослых:Острый синусит.Обострение хронического бронхита. Внебольничная пневмония.Неосложненные инфекции мочевыводящих путей. Осложненные инфекции мочевыводящих путей (в т.ч. Пиелонефрит).Хронический бактериальный простатит.Инфекции кожи и мягких тканей.Септицемия/бактериемия, связанные с указанными выше Показания к применениюми.Инфекции брюшной полости.Комплексное лечение лекарственно-устойчивых форм туберкулеза.

**Способ применения и дозы**

Препарат принимают внутрь 1-2 раза/сут. Таблетки следует проглатывать целиком, не разжевывая и запивая достаточным количеством жидкости (от 0.5 до 1 стакана). Препарат можно принимать перед едой или между приемами пищи. Дозы определяются характером и тяжестью инфекции, а также чувствительностью предполагаемого возбудителя. Пациентам с нормальной или умеренно сниженной функцией почек (КК >50 мл/мин) рекомендуется следующий режим дозирования препарата. При синусите назначают по 500 мг 1 раз/сут в течение 10-14 дней. При обострении хронического бронхита - по 250 мг или по 500 мг 1 раз/сут в течение 7-10 дней. При внебольничной пневмонии - по 500 мг 1-2 раза/сут в течение 7-14 дней. При неосложненных инфекциях мочевыводящих путей - по 250 мг 1 раз/сут в течение 3 дней. При простатите - по 500 мг 1 раз/сут в течение 28 дней. При осложненных инфекциях мочевыводящих путей, включая пиелонефрит, - по 250 мг 1 раз/сут в течение 7-10 дней. При инфекциях кожи и мягких тканей - по 250-500 мг 1-2 раза/сут в течение 7-14 дней. При инфекциях брюшной полости - по 500 мг 1 раз/сут в течение 7-14 дней (в комбинации с антибактериальными препаратами, действующими на анаэробную флору).

**Противопоказания**

Эпилепсия. Поражение сухожилий при ранее проводившемся лечении хинолонами. Беременность. Период лактации (грудного вскармливания). Детский и подростковый возраст (до 18 лет). Повышенная чувствительность к левофлоксацину и другим фторхинолонам. С осторожностью следует назначать препарат пациентам пожилого возраста (из-за высокой вероятности наличия сопутствующего снижения функции почек), при дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Применение препарата противопоказано при беременности и в период лактации.

**Побочные действия**

Со стороны сердечно-сосудистой системы редко - синусовая тахикардия, снижение АД. частота неизвестна - удлинение интервала QT.Со стороны системы кроветворения нечасто - лейкопения (уменьшение количества нейтрофилов в крови), тромбоцитопения (уменьшение количества тромбоцитов в крови). частота неизвестна - панцитопения (уменьшение количества всех форменных элементов в периферической крови), агранулоцитоз (отсутствие или резкоеуменьшение количества гранулоцитов в периферической крови), гемолитическая анемия.Со стороны нервной системы часто - головная боль, головокружение. нечасто -

сонливость, тремор, дисгевзия (извращение вкуса). редко - парестезия, судороги. частота неизвестна - периферическая сенсорная невропатия, периферическая сенсорномоторная невропатия, дискинезия, экстрапирамидные расстройства, потеря вкусовых ощущений, паросмия (расстройство ощущение запаха, особенно субъективное ощущение запаха, объективно отсутствующего), включая потерю обоняния.Психические нарушения часто - бессонница. нечасто - чувство беспокойства, спутанность сознания. редко - психические нарушения (например, с галлюцинациями), депрессия, ажитация (возбуждение), нарушение сна, ночные кошмары. частота неизвестна - нарушения психики с нарушениями поведения с причинением себе вреда, включая суицидальные мысли и суицидальные попытки.Со стороны органа зрения очень редко - нарушения зрения, такие как расплывчатость видимого изображения.Со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения нечасто - вертиго (чувство отклонения или кружения собственного тела или окружающих предметов).Со стороны дыхательной системы нечасто - одышка. частота неизвестна - бронхоспазм, аллергический пневмонит.Со стороны пищеварительной системы часто - диарея, рвота, тошнота, повышение активности печеночных ферментов в крови (например, АЛТ, АСТ). нечасто - анорексия, боли в животе, диспепсия, повышение концентрации билирубина в крови. частота неизвестна - геморрагическая диарея, которая в очень редких случаях может быть признаком энтероколита, включая псевдомембранозный колит, тяжелая печеночная недостаточность, включая случаи развития острой печеночной недостаточности, особенно у пациентов с тяжелым основным заболеванием (например, при сепсисе). гепатит.Со стороны мочевыделительной системы нечасто - повышенная концентрация креатинина в сыворотке крови. редко - острая почечная недостаточность (например, вследствие развития интерстициального нефрита).Со стороны кожи и подкожных тканей нечасто - сыпь, зуд. частота неизвестна - лейкоцитокластический васкулит. Реакции со стороны кожи и слизистых оболочек могут иногда развиваться даже после приема первой дозы препарата.Со стороны костно-мышечной системы нечасто - артралгия, миалгия. редко - поражения сухожилий, включая тендинит (например, ахиллова сухожилия), мышечная слабость, которая может быть особенно опасна у пациентов с псевдопаралитической миастенией (myasthenia gravis). частота неизвестна - рабдомиолиз, разрыв сухожилия (например, ахиллова сухожилия). Этот побочный эффект может наблюдаться в течение 48 ч после начала лечения и может носить двухсторонний характер.Со стороны обмена веществ редко - гипогликемия, особенно у пациентов с сахарным диабетом (возможные признаки гипогликемии волчий аппетит, нервозность, испарина, дрожь).Инфекционные и паразитарные заболевания нечасто - грибковые инфекции, развитие резистентности патогенных микроорганизмов.Со стороны иммунной системы нечасто - крапивница. редко - ангионевротический отек. частота неизвестна - токсический эпидермальный некролиз,

синдром Стивенса-Джонсона, экссудативная многоформная эритема, реакции фотосенсибилизации (повышенной чувствительности к солнечному и ультрафиолетовому излучению), анафилактический шок, анафилактоидный шок. Анафилактические и анафилактоидные реакции могут иногда развиваться даже после приема первой дозы препарата.Прочие нечасто - астения. редко - пирексия (повышение температуры тела).Другие возможные нежелательные эффекты, относящиеся ко всем фторхинолонамОчень редко приступы порфирии (очень редкой болезни обмена веществ) у пациентов, уже страдающих этим заболеванием.

**Передозировка**

Симптомы: тошнота, эрозивные поражения слизистой оболочки ЖКТ, удлинение интервала QT, спутанность сознания, головокружение, судороги. Лечение: проводят симптоматическую терапию, диализ не эффективен.

**Взаимодействие с другими препаратами**

При одновременном применении левофлоксацин увеличивает T1/2 циклоспорина. Действие препарата снижают лекарственные средства, угнетающие моторику кишечника, сукральфат, алюминий/магнийсодержащие антацидные лекарственные средства и соли железа (необходим перерыв между приемом не менее 2 ч). При одновременном применении Глево с НПВС, теофиллином повышается судорожная готовность. При одновременном применении Глево с ГКС повышается риск разрыва сухожилий. Циметидин и препараты, блокирующие канальцевую секрецию, замедляют выведение левофлоксацина. При одновременном применении гипогликемических препаратов с левофлоксацином возможно развитие гипо- и гипергликемии. Поэтому необходим строгий контроль уровня глюкозы в крови.

**Особые указания**

Хотя левофлоксацин более растворим, чем другие хинолоны, пациентам следует проводить адекватную гидратацию организма. Во время лечения необходимо избегать солнечного и искусственного УФ-облучения во избежание повреждения кожных покровов (фотосенсибилизация). При появлении признаков тендинита, псевдомембранозного колита левофлоксацин немедленно отменяют и назначают соответствующую терапию. Следует иметь в виду, что у больных с поражением головного мозга в анамнезе (инсульт, тяжелая травма) возможно развитие судорог, при недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы повышается риск развития гемолиза. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами: В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Условия хранения**

В защищенном от солнца помещении