Инструкция по применению
Глиатилин Капсулы 400 мг 14 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Си Эс Си
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Холина альфосцерат
Количество в упаковке: 14
Дозировка действующего вещества: 400 мг

Действующее вещество

Холина альфосцерат

Состав

1 капсула содержит:Активное вещество: холина альфосцерат 400 мг.Вспомогательные вещества: глицерол, вода очищенная.Состав оболочки капсулы: желатин, эзитол, сорбитан, этилпарагидроксибензоат натрия, пропилпарагидроксибензоат натрия, титана диоксид (Е171), железа (III) мета-гидроксид (Е172).

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Всасывание и распределение:После приема внутрь абсорбция составляет 88%.Легко проникает через ГЭБ, накапливается преимущественно в головном мозге (концентрация достигает 45% от уровня в плазме крови), легких и печени.Метаболизм и выведение85% выводится легкими в виде диоксида углерода, остальное количество (15%) - почками и через кишечник.

Показания

Острый период черепно-мозговой травмы преимущественно со стволовыми поражениями (в том числе принарушении сознания, коматозном состоянии). Нарушения мозгового кровообращения по ишемическому и геморрагическому типу (в остром ивосстановительном периоде).Дегенеративные и инволюционные психоорганические синдромы и последствия цереброваскулярной недостаточности, такие как первичные и вторичные нарушения мнестических функций, характеризующиеся нарушениями памяти, спутанностью сознания, дезориентацией, снижением мотивации, инициативности и способности к концентрации внимания. Изменения в эмоциональной и поведенческой сфере: эмоциональная нестабильность, раздражительность, снижение интереса. Старческая псевдомеланхолия.

Способ применения и дозы

Взрослым, при острых состояниях: в/м - в дозе 1000 мг/сут (1 ампула) или в/в - 1000–3000 мг/сут.При в/в введении содержимое 1 ампулы (4 мл) разводят в 50 мл физиологического раствора, скорость инфузии - 60–80 капель в минуту. Продолжительность лечения - обычно 10 дней, но при необходимости лечение можно продолжать до появления положительной динамики и возможности перейти на прием внутрь капсул.Внутрь, до еды. При хронической цереброваскулярной недостаточности, изменениях в эмоциональной и поведенческой сфере и мультиинфарктной деменции: внутрь - по 400 мг (1 капсула) 3 раза в сутки. Продолжительность терапии - 3–6 месяцев.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) противопоказано.

Побочные действия

Тошнота (как следствие допаминергической активации), в этом случае следует снизить дозу препарата. Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы: тошнота. При появлении данного симптома рекомендуют снизить дозу препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Глиатилин не установлено.

Особые указания

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами: Глиатилин не влияет на способность пациента заниматься потенциально опасными видами деятельности.