Инструкция по применению
Глицерин Суппозитории ректальные 1,24 г 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Глицерол
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 1.24 г



Описание

Суппозитории прозрачные или полупрозрачные, почти бесцветные или с желтовато-коричневым оттенком, с мажущей поверхностью, гигроскопичны, торпедообразной формы.Допускается помутнение суппозитория, незначительное размягчение поверхностного слоя и подпотевание контурной упаковки.Суппозитории однородны на продольном срезе. На срезе допускается наличие воздушного стержня.

Действующее вещество

Глицерол

Состав

На 1 суппозиторий:действующее вещество: глицерин (глицерол) - 1,24 г в пересчете на 100% содержание глицерина (что соответствует 1,32 г 94% глицерола с плотностью не менее 1,2481 г/см),вспомогательные вещества: макрогол 400 (полиэтиленоксид 400) - 0,12 г, стеариновая кислота - 0,12 г, натрия карбоната декагидрат (натрий углекислый 10-водный) - 0,060 г.

Форма выпуска

Суппозитории

Фармакокинетика

Активно метаболизируется в печени. Выводится через почки, в неизменном виде выделяется 7-14%.

Показания

Симптоматическое лечение запоров различной этиологии (когда использование пероральных препаратов невозможно).Профилактика запоров у пациентов, которые не могут напрягаться при дефекации: болезненный тромбированный геморрой, трещины заднего прохода или перианальный абсцесс, аноректальный стеноз, после перенесенного инфаркта миокарда.

Способ применения и дозы

Ректально.Вводят препарат в прямую кишку и оставляют там не менее 5 минут. Обычно дефекация происходит через 5-10 минут после введения средства. Остатки суппозитория выводится из кишечника с калом.Детям с 5 до 12 лет назначают по 1 суппозиторию, содержащему 1,24 г глицерола, 1 раз в сутки.Детям старше 12 лет и взрослым назначают по 1 суппозиторию, содержащему 2,11 г глицерола, 1 раз в сутки. При необходимости дозу повышают до 2 суппозиториев в сутки.Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отменеНет сведений.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к глицеролу или любому из компонентов препарата. Синдром раздраженного кишечника, кишечная непроходимость, аппендицит, кровотечение, диарея, геморрой в стадии обострения, трещины заднего прохода, воспалительные заболевания и опухоли прямой кишки, недиагностированная боль в животе, геморрагический ректоколит, детский возраст до 5 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности и в период грудного вскармливания препарат можно использовать только если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Неизвестно, экскретируется ли глицерин в грудное молоко, поэтому данный препарат используется, только если, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Побочные действия

При длительном применении возможно ослабление физиологического процесса дефекации.Аллергические реакции, местные реакции (зуд, жжение в области ануса), появление спастических болей в области кишечника.При развитии побочных эффектов необходимо обратиться к врачу.

Передозировка

Симптомом передозировки является частый жидкий стул.В случае передозировки следует отменить препарат.

Взаимодействие с другими препаратами

Нет сведений.

Особые указания

Перед и после использования суппозиториев следует тщательно вымыть руки. Систематический прием не рекомендуется.Лечение прекращают после восстановления нормальной перистальтики кишечника.Не рекомендуется использовать суппозитории курсом дольше 1 недели.Не смазывать суппозитории минеральными жидкими или твердыми маслами.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Нет сведений.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.