Инструкция по применению
Глицин Форте Таблетки 250 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: КАНОНФАРМА ПРОДАКШН
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Глицин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 250 мг



Описание

Таблетки круглые двояковыпуклые с крестообразной риской, белого или почти белого цвета. Допускается незначительная мраморность.

Действующее вещество

Глицин

Состав

1 таблетка защечная содержит: активного вещества глицин - 250 мг; вспомогательные вещества: аспартам - 0,4 мг, коповидон 9,6 мг, магния стеарат 2,0 мг, сорбитол 8,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Легко проникает в большинство биологических жидкостей и тканей организма, в том числе в головной мозг, не кумулирует. Быстро разрушается в печени глициноксидазой до воды и углекислого газа.

Показания

В составе комплекснои# терапии ишемического инсульта. В составе комплекснои# терапии различных функциональных и органических заболевании# нервнои# системы, сопровождающихся повышеннои# возбудимостью, эмоциональнои# нестабильностью, снижением умственнои# работоспособности и нарушением сна (неврозы, неврозоподобные состояния, вегетососудистая дистония, последствия неи#роинфекции# и черепно-мозговои# травмы, перинатальные и другие формы энцефалопатии# (в т.ч. алкогольного генеза)). В составе комплекснои# терапии девиантных форм поведения детеи# и подростков.

Способ применения и дозы

Сублингвально или трансбуккально по 250 мг (в таблетках или в виде порошка после измельчения таблетки). Детям, подросткам и взрослым при психоэмоциональных напряжениях, снижении памяти, внимания, умственной работоспособности, задержке умственного развития, при девиантных формах поведения глицин назначается по таблетки 2-3 раза в день в течение 14-30 дней. При функциональных и органических поражениях нервной системы, сопровождающихся повышенной возбудимостью, эмоциональной лабильностью и нарушением сна, детям до 3 лет назначают по ¼ таблетки 2-3 раза в день в течение 7-14 дней, в дальнейшем по ¼ таблетки 1 раз в день на протяжении 7-10 дней. Суточная доза - 100-150 мг, курсовая - 2-2,6 г. Детям старше 3 лет и взрослым назначают по ½ таблетки 2-3 раза в день, курс лечения - 7-14 дней. Его можно увеличить до 30 дней. При необходимости курс повторяют через 30 дней. При нарушениях сна назначают за 20 минут до сна или непосредственно перед сном по ¼-1/2 таблетки (в зависимости от возраста).   При нарушениях сна назначают за 20 минут до сна или непосредственно перед сном по ¼-1/2 таблетки (в зависимости от возраста). При ишемическом мозговом инсульте: в течение первых 3-6 часов от развития инсульта назначают 1 г (4 таблетки) трансбуккально или сублингвально с 1 чайной ложкой воды, далее в течение 1-5 суток по 1 г/сутки (по 4 таблетки), затем в течение последующих 30 суток по ½-1 таблетке 3 раза в сутки. В наркологии - по ½ таблетки 2-3 раза в день в течение 14-30 дней. При необходимости курсы повторяют 4-6 раз в год.

Противопоказания

Гиперчувствительность

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата не рекомендуется в период беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием достаточного количества данных о безопасности применения препарата в данный период.

Побочные действия

Аллергические реакции, сонливость.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

Взаимодействие с другими препаратами

Ослабляет выраженность побочных эффектов антипсихотических ЛС (нейролептиков), анксиолитиков, антидепрессантов, снотворных и противосудорожных лекарственных средств.

Особые указания

У пациентов со склонностью к артериальной гипотензии назначение производится в меньших дозах и при контроле артериального давления. При его снижении ниже привычного уровня прием прекращается. Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами При приеме препарата следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С во вторичной упаковке (пачке картонной). Хранить в недоступном для детей месте.