Инструкция по применению
Глицирам таблетки 50мг N50

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аммония глицирризинат
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 50 мг
Срок годности: 24



Действующее вещество

Аммония глицирризинат

Состав

Аммония глицирризинат 50 мг

Форма выпуска

Таблетки

Показания

— в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях дыхательных путей с трудноотделяемой мокротой (в т.ч. при бронхиальной астме); — в качестве слабительного средства у лиц с повышенной кислотностью желудка; — экзема, аллергический дерматит; — астенические состояния; — артериальная гипотензия; — болезнь Аддисона (диэнцефально-гипофизарные формы, в виде монотерапии и в сочетании с АКТГ); — надпочечниковая недостаточность (на фоне длительной терапии ГКС), в т.ч. профилактика синдрома отмены в период прекращения лечения ГКС или снижения их дозировки.

Способ применения и дозы

Внутрь.; Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 0,05 г - 0,1 г (1-2 таблетки) 2 раза в день через 30 мин после еды.; В более тяжелых случаях разовая доза препарата составляет 0,1 г 3-6 раз в день.; Курс лечения от 2 недель до 6 месяцев.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.; Тяжелые органические поражения сердца и паренхиматозных органов.; Беременность.; Период лактации.; Детский возраст (до 12 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение при беременности и кормлении грудью.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно усиление действия препаратов, стимулирующих функцию коры надпочечников.

Условия хранения

В сухом месте