Инструкция по применению
Глимепирид Таблетки 2 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Пранафарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Глимепирид
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 2 мг



Описание

Таблетки белого цвета. Допускается наличие легкой мраморности. Таблетки 2 мг - круглые, плоскоцилиндрические, без риски.

Действующее вещество

Глимепирид

Состав

Препарат ГЛИМЕПИРИД содержит: Действующим веществом является глимепирид. Каждая таблетка содержит 2 миллиграмм глимепирида. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102), натрия крахмал гликолят (тип А), повидон К-25, полоксамер (тип 188), магния стеарат. Препарат ГЛИМЕПИРИД содержит лактозу (см. раздел «Особые указания»).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат ГЛИМЕПИРИД показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет для лечения сахарного диабета 2 типа (в монотерапии или в составе комбинированной терапии с метформином или инсулином), в дополнение к диете, физической нагрузке и снижению массы тела.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом. Доза препарата ГЛИМЕПИРИД зависит от Вашего состояния и уровня сахара (глюкозы) в крови, и определяется врачом. Во время лечения препаратом ГЛИМЕПИРИД врач будет регулярно определять уровень сахара и гликированного гемоглобина (гемоглобин, связанный с сахаром) в крови. Рекомендуемая доза Доза препарата ГЛИМЕПИРИД зависит от результатов анализов крови и мочи на выявление уровня глюкозы и определяется врачом. Не принимайте таблеток больше, чем назначил Ваш лечащий врач. Начальная доза и подбор дозы 1 таблетка 1 мг 1 раз в день. При необходимости врач может увеличивать дозу каждые 1-2 недели лечения. Максимальная рекомендуемая доза составляет 6 мг глимепирида в сутки, но для некоторых пациентов максимальная доза составляет 8 мг. При недостаточном контроле уровня сахара в крови врач может дополнительно назначить Вам другие препараты, такие как метформин или инсулин. В таком случае Ваш врач определит надлежащие дозы препарата ГЛИМЕПИРИД, метформина и инсулина индивидуально для Вас. Сообщите Вашему врачу, если: у Вас изменилась масса тела, Вы изменили образ жизни (изменение диеты, времени приема пищи, количества физических нагрузок), Вы испытываете стресс. Указанные состояния могут потребовать изменения дозы препарата ГЛИМЕПИРИД. Нарушения функции почек или печени Если у Вас есть проблемы с почками или печенью, сообщите об этом лечащему врачу, так как Вам может потребоваться изменение дозы. Путь и (или) способ введения Принимайте таблетки внутрь, не разжевывая и запивая достаточным количеством жидкости (около половины стакана). Таблетки следует проглатывать целиком, не раздавливайте и не разжевывайте таблетки. При необходимости таблетки 4 мг могут быть разделены вдоль риски с целью облегчения проглатывания. Риска не предназначена для деления таблетки на две равные дозы. Обычно достаточно принимать препарат ГЛИМЕПИРИД 1 раз в сутки, перед полноценным завтраком. Очень важно после приема препарата ГЛИМЕПИРИД не пропускать прием пищи. Если Вы забыли принять препарат ГЛИМЕПИРИД Если Вы забыли принять препарат ГЛИМЕПИРИД вовремя (как рекомендовано - перед завтраком), не принимайте двойную дозу, чтобы восполнить пропущенную дозу. Примите рекомендуемую дозу перед следующим основным приемом пищи. Очень важно после приёма препарата ГЛИМЕПИРИД не пропускать приём пищи. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к лечащему врачу.

Противопоказания

Не принимайте препарат ГЛИМЕПИРИД: если у Вас аллергия на глимепирид, другие производные сульфонилмочевины (например, глибенкламид), сульфаниламиды (антибактериальные препараты, такие как сульфаметоксазол) или любые другие компоненты препарата, если у Вас сахарный диабет 1 типа (инсулинзависимый сахарный диабет), если у Вас диабетический кетоацидоз (осложнение диабета, связанное с накоплением кетоновых тел, при котором уровень глюкозы в крови повышается). При этом состоянии Вы можете испытывать усталость, тошноту, жажду, частое мочеиспускание, мышечную слабость, сухость кожи, если Вы находитесь в диабетической прекоме (возникает тошнота, частая рвота, одышка, выраженная жажда, сознание сохранено) и коме (нарушение сознания, при котором полностью отсутствует психическая деятельность и контакт с окружающим миром), если у Вас тяжелое заболевание почек или печени тяжелой степени.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность Препарат ГЛИМЕПИРИД противопоказан при беременности. В случае планируемой беременности или при наступлении беременности врач отменит лечение препаратом ГЛИМЕПИРИД и переведет Вас на лечение инсулином. Грудное вскармливание Сообщите врачу, если Вы кормите грудью ребенка или собираетесь кормить грудью. Неизвестно, может ли препарат ГЛИМЕПИРИД проникать в грудное молоко, поэтому его нельзя принимать в период грудного вскармливания. В этом случае врач может рекомендовать Вам отказаться от кормления грудью. Нет данных

Побочные действия

Нежелательные реакции при приёме глимепирида Побочные эффекты возникают не у всех пациентов. Срочно обратитесь к врачу при: Гипогликемии (низкий уровень сахара в крови): редко (⩽ 1 из 1000) опасна для жизни при длительном снижении уровня сахара требуется немедленное повышение уровня глюкозы. Аллергических и псевдоаллергических реакциях (зуд, крапивница, сыпь): редко (⩽ 1 из 1000) возможны тяжёлые формы: одышка, резкое снижение АД, анафилактический шок. Нарушениях функции печени (желтуха, холестаз, гепатит, печёночная недостаточность): очень редко (⩽ 1 из 10 000). Тяжёлой тромбоцитопении (тромбоциты тромбоцитопения — редко (⩽ 1 из 1000) пурпура — частота неизвестна симптомы: синяки, длительные кровотечения, носовые кровотечения, кровоизлияния в слизистые. Редко (⩽ 1 из 1000): тошнота рвота ощущение тяжести или переполнения в желудке боль в животе диарея тромбоцитопения. Частота неизвестна: гипонатриемия фотосенсибилизация аллергический васкулит лейкопения эритроцитопения гранулоцитопения, агранулоцитоз, панцитопения гемолитическая анемия увеличение массы тела дисгевзия алопеция. В начале лечения возможны временные нарушения зрения из-за изменения уровня сахара в крови (связано с изменением преломляющей способности хрусталика). При любых нежелательных реакциях — проконсультируйтесь с врачом (в т. ч. при симптомах, не указанных в этом списке). Ваше сообщение о побочных эффектах помогает улучшить данные о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы приняли препарата ГЛИМЕПИРИД больше, чем следовало Если Вы приняли препарата ГЛИМЕПИРИД больше, чем следовало, существует опасность развития гипогликемии (для получения дополнительной информации о гипогликемии обратитесь к информации «Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия)» в разделе «Особые указания»). Вам следует незамедлительно принять сахар (например, кусочки сахара, сладкий сок или чай) и немедленно проинформировать врача. В связи с этим Вам следует всегда иметь при себе не менее 20 г сахара (4 кусочка сахара). Не следует принимать сахарозаменители и содержащие их продукты, так как они неэффективны при лечении гипогликемии. При лечении гипогликемии вследствие случайного приёма у детей, необходимо тщательно контролировать количество принимаемого сахара во избежание возможности развития опасной гипергликемии (высокий уровень сахара в крови). Лицам, находящимся в бессознательном состоянии, нельзя давать пищу или напитки. Поскольку состояние гипогликемии может длиться некоторое время, врач будет контролировать Ваше состояние до исчезновения опасности, так как гипогликемия может возобновиться даже после первоначального восстановления уровня сахара в крови. Также может понадобиться госпитализация как мера предосторожности. Покажите врачу упаковку или оставшиеся таблетки, чтобы врач знал, что было принято. Тяжёлые случаи гипогликемии, сопровождающиеся потерей сознания и тяжёлыми нарушениями нервной системы (неврологической симптоматикой) - это случаи неотложного состояния, требующие немедленного лечения и госпитализации. Необходимо, чтобы всегда было предварительно информированное лицо (люди, живущие с Вами), которое может позвонить врачу в экстренном случае.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Ваш врач может изменить дозу глимепирида, если Вы принимаете другие лекарственные препараты, способные ослабить или усилить влияние глимепирида на уровень сахара. Уровень сахара в крови может снижаться (гипогликемия), если Вы принимаете: инсулин и другие сахароснижающие препараты для приема внутрь (другие препараты для лечения сахарного диабета), ингибиторы АПФ (препараты для снижения повышенного артериального давления), анаболики (препараты, способствующие увеличению мышц), препараты, содержащие мужские половые гормоны, тетрациклины, хлорамфеникол, хинолоны, кларитромицин, сульфаниламиды (препараты для лечения бактериальных инфекций), флуконазол, миконазол (препараты для лечения грибковых инфекций), фенилбутазон, азапропазон, оксифенбутазон, парааминосалициловая кислота,

салицилаты (препараты для лечения боли и воспаления), производные кумарина (препараты для разжижения крови), флуоксетин (препарат для лечения депрессии), ингибиторы МАО (препараты для лечения депрессии и болезни Паркинсона), фенирамидол (препарат, расслабляющий мышцы), фибраты (препараты, снижающие высокий уровень холестерина), дизопирамид (препарат для лечения нарушений ритма сердца), аллопуринол, пробенецид, сульфинпиразон (препараты для лечения подагры), циклофосфамид, ифосфамид, трофосфамид (препараты для лечения рака), фенфлурамин (препарат для снижения веса), пентоксифиллин (препарат для улучшения кровообращения, вводимый внутривенно в больших дозах), тритоквалин (препарат для лечения крапивницы и сенной лихорадки), гуанетидин (препарат, называемый симпатолитиком, для лечения повышенного артериального давления). Уровень сахара в крови может повышаться (гипергликемия), если Вы принимаете: эстрогены, прогестагены (препараты, содержащие женские половые гормоны), диуретики (препараты, усиливающие выработку мочи), йодсодержащие гормоны щитовидной железы (препараты, применяемые для лечения заболеваний щитовидной железы), глюкокортикостероиды (гормональные противовоспалительные препараты), фенотиазин (препарат для лечения психических расстройств), никотиновая кислота в больших дозах (витамин В3), слабительные (препараты для лечения запора при длительном применении), фенитоин (препарат для лечения судорог), барбитураты (препараты для лечения судорог и проблем со сном), ацетазоламид (препарат для лечения повышенного внутриглазного давления), диазоксид (препарат для лечения повышенного артериального давления), рифампицин (препарат для лечения инфекций, туберкулеза), глюкагон (препарат для лечения очень низкого уровня сахара в крови), адреналин и симпатомиметики. Уровень сахара в крови может как повышаться, так и снижаться, если Вы принимаете: блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов (препараты для лечения язвы желудка). Бета-адреноблокаторы, клонидин, гуанетидин и резерпин (препараты для лечения повышенного артериального давления или сердечной недостаточности) Могут маскировать признаки гипогликемии, поэтому при приеме этих препаратов необходимо особое внимание. Глимепирид может как усиливать, так и ослаблять действие следующих препаратов Производные кумарина (препараты, разжижающие кровь), Колесевелам (препарат, применяемый для снижения холестерина) влияет на всасывание глимепирида. Для предотвращения этого эффекта Вам следует принимать препарат ГЛИМЕПИРИД по меньшей мере за 4 часа до приема колесевелама. Прием препарата ГЛИМЕПИРИД с алкоголем Прием алкоголя может усиливать или ослаблять сахароснижающее действие глимепирида. Не следует принимать алкоголь во время лечения препаратом ГЛИМЕПИРИД.

Особые указания

Глимепирид: важная информация о гипогликемии и применении Передозировка глимепиридом При приёме большей дозы, чем назначено, возникает риск гипогликемии. Действия: Немедленно принять 20 г сахара (например, 4 кусочка сахара, сладкий сок или чай). Сообщить врачу. Не использовать сахарозаменители — они неэффективны. При бессознательном состоянии нельзя давать пищу/напитки. Врач будет контролировать состояние до исчезновения риска рецидива. В тяжёлых случаях (потеря сознания, неврологическая симптоматика) требуется срочная госпитализация. Покажите врачу упаковку или оставшиеся таблетки. Гипогликемия (низкий уровень сахара в крови) Риск особенно высок в первые недели приёма. Регулярно проверяйте уровень глюкозы. Факторы риска гипогликемии Недостаточное питание или снижение углеводов в рационе. Пропуск или задержка приёма пищи. Изменение диеты. Повышенная физическая активность без коррекции питания. Употребление алкоголя (особенно при недостаточном питании). Тяжёлые нарушения функции почек или печени. Несоблюдение дозировки или рекомендаций врача. Эндокринные нарушения (гипотиреоз, недостаточность гормонов гипофиза /надпочечников). Приём препарата не по показаниям. Признаки гипогликемии Ранние: потливость, липкая кожа, беспокойство, тахикардия, повышение АД. Поздние: головная боль, сильный голод, тошнота, рвота усталость, сонливость, беспокойство, проблемы со сном агрессивность, трудности с концентрацией, замедленные реакции депрессия, растерянность, нарушения речи изменение зрения, дрожь, паралич, покалывание в руках/вокруг рта головокружение, потеря самоконтроля, судороги, потеря сознания. Что делать при гипогликемии? Принять сахар (кусочки сахара, сладкий сок/чай). Если симптомы не проходят или повторяются — обратиться к врачу или в больницу. В тяжёлых случаях — госпитализация. Лабораторные тесты Ежедневный контроль уровня глюкозы (глюкометр). Периодический анализ крови (лейкоциты, тромбоциты, функция печени) — по назначению врача. Особые указания Дети: противопоказан до 18 лет (недостаток клинических данных). Лактоза: проконсультируйтесь с врачом при непереносимости сахаров. Вождение транспорта: гипо- или гипергликемия может влиять на способность управлять ТС. Уточните у врача, если: часто возникают эпизоды гипогликемии трудно распознавать признаки снижения сахара. Важные напоминания Читайте листок-вкладыш перед применением. Храните его для повторного ознакомления. Не передавайте препарат другим — он может быть опасен. Сообщайте врачу о любых нежелательных реакциях.

Условия хранения

Для лекарственного препарата не требуются специальные условия хранения. Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.